

**К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СЛУЧАЙНОЙ ХОРДЫ В ВЫПУКЛОМ ТЕЛЕ**

И. Э. НААЦ

(Представлена научным семинаром УВЛ ТПИ)

При изучении статистики случайной среды с использованием вероятностно-геометрической модели заполнения трехмерного пространства системой выпуклых тел методом случайной секущей возникает необходимость оценки моментов случайной хорды в телах заполнения [1]. Для практической цели обычно можно ограничиться первыми двумя моментами.

В настоящей работе рассматриваются вопросы методики расчета моментов случайной хорды в выпуклом теле и приводятся оценки первого момента для некоторых тел элементарной формы. Пусть имеется некоторое выпуклое тело T и множество случайных хорд I в этом теле. Множество случайных хорд в свою очередь можно рассматривать как порождение множества всех линий J в трехмерном пространстве R_3 , имеющих хотя бы одну общую точку с телом T . В свою очередь, множество J есть подмножество множества всех линий в R_3 .

Задать линию в R_3 можно системой двух уравнений

$$\left. \begin{aligned} x &= p_1 z + q_1 \\ y &= p_2 z + q_2 \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Параметры p_1 , p_2 , q_1 и q_2 образуют в совокупности параметрическое пространство P множества линий. Параметрическое пространство P однозначно определяет множество линий в R_3 .

Элемент меры пространства P , инвариантный относительно группы вращений и перемещений в R_3 , определяется выражением [1]:

$$dP = (1 + p_1^2 + p_2^2)^{-2} dp_1 dp_2 dq_1 dq_2. \quad (2)$$

Для расчета значений случайной хорды необходимо определить меру множества P' , являющегося подмножеством P и соответствующего множеству линий I , секущих данное тело T . Формально это можно сделать путем решения системы

$$\left. \begin{aligned} F(x, y, z) &= 0 \\ x &= p_1 z + q_1 \\ y &= p_2 z + q_2 \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

где $F(x, y, z) = 0$ уравнение поверхности тела T , и исследованием области, внутри которой корни системы $z_1(x_1, y_1)$ и $z_2(x_2, y_2)$ вещественны и различны. Равенство корней друг к другу соответствует множеству касательных к телу T . Длина хорды определится как расстояние между корнями в R_3 . В результате среднее значение хорды определится выражением

$$\bar{l} = \frac{1}{m(P')} \int_{m(P')} l dP', \quad (4)$$

где $m(P')$ — мера параметрического пространства P' , соответствующего множеству случайных секущих. Аналогично определяются остальные моменты величины l . Величина меры множества P' определяется топологическими свойствами тела T . В частности, доказано, что для выпуклого тела поверхностью S [1]

$$m(P') = \frac{1}{2} \pi S. \quad (5)$$

Использовать описанную методику в общем виде для практических расчетов весьма затруднительно. Поэтому обычно прибегают к следующему приему. Строят вначале подмножество секущих, соответствующее некоторому выбранному направлению n . Мера этого подмножества, как нетрудно определить, равна

$$dF = \frac{1}{2} F(\vec{n}) d\omega, \quad (6)$$

где $F(\vec{n})$ — площадь проекции тела T на некоторую плоскость, перпендикулярную направлению \vec{n} , и $d\omega$ — элемент телесного угла. Тогда полная мера множества секущих определится выражением

$$m(P') = \int dF = \frac{1}{2} \int F(\vec{n}) d\omega = 2\pi \bar{F}. \quad (7)$$

Среднее значение хорды определится интегралом

$$\bar{l} = \frac{1}{m(P')} \cdot \frac{1}{2} \int \int l dF(\vec{n}) d\omega. \quad (8)$$

Нетрудно видеть, что

$$\int l dF(\vec{n}) = V \quad (9)$$

и

$$\bar{l}(\vec{n}) \cdot F(\vec{n}) = V, \quad (10)$$

где V — объем тела и $\bar{l}(\vec{n})$ — среднее значение случайной хорды на множестве секущих, параллельных данному направлению \vec{n} . Откуда с учетом (5) можно записать два важных соотношения:

$$\bar{l} = \frac{4V}{S}, \quad (11)$$

$$S = 4F, \quad (12)$$

где \bar{F} — средняя проекция тела на плоскость в направлении \vec{n} при вращении этого тела относительно этой плоскости.

Вычисление среднего значения случайной хорды и ее моментов более высокого порядка является весьма сложным и трудоемким даже для тел элементарной формы. Однако в ряде случаев можно обойтись оценками указанных величин. В частности, используя соотношения (10), (11), (12), можно построить для среднего значения l ряд оценок для тел элементарной формы.

Пусть выпуклое тело объема V вращается относительно вектора \vec{n} и плоскости проекции, перпендикулярной к \vec{n} . Тогда величины $\bar{l}(\vec{n})$ и $F(\vec{n})$ будут меняться в зависимости от ориентации тела в пространстве. Однако произведение этих величин остается при этом постоянным и равным объему V , как это следует из (10). Поэтому если возможно определить для данного тела наибольшее и наименьшее значения ортогональной проекции на некоторую плоскость (т. е. F_{\max} и F_{\min}), то для \bar{l} справедливо неравенство

$$\frac{V}{F_{\max}} \leq \bar{l} \leq \frac{V}{F_{\min}}. \quad (13)$$

В соотношении (13) равенство достигается для шара, у которого $F(\vec{n}) = \text{const}$ для всех положений в пространстве относительно плоскости проекций.

В качестве примера можно рассмотреть эллипсоид, для которого $F_{\max} = \pi ab$ и $F_{\min} = \pi bc$ при полуосях, удовлетворяющих условию $a > b > c$. Для такого эллипсоида из (13) имеем неравенство

$$\frac{4}{3}c < \bar{l} < \frac{4}{3}a. \quad (14)$$

Для куба с ребром a

$$F_{\min} = a^2, F_{\max} = a^2 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \text{ и}$$

соответственно

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}} a < \bar{l} < a. \quad (15)$$

Для выпуклого тела произвольной формы можно построить нижнюю оценку для \bar{l} , используя следующий факт: для выпуклого тела площадь проекции F в любом направлении удовлетворяет неравенству [2]

$$F^2 \leq F_1^2 + F_2^2 + F_3^2, \quad (16)$$

где F_1, F_2, F_3 — соответственно значения проекций этого тела в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Откуда нетрудно получить нижнюю оценку для \bar{l} , а именно:

$$\frac{V}{\sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2}} = l' \leq \bar{l}. \quad (17)$$

Равенство в (17) достигается для плоской фигуры, поэтому оценка (17) тем точнее, чем более вытянуто тело относительно какой-либо из осей или направления.

Для выпуклого тела объема V можно построить верхнюю оценку для среднего значения случайной хорды, используя замечательное параметрическое свойство шара, которое заключается в том, что среди всех выпуклых тел данного объема шар имеет наименьшую поверхность [2]. Тогда из (11) следует верхняя оценка для среднего значения случайной хорды выпуклого тела

$$\bar{l} \leq \bar{l}_0, \quad (18)$$

где \bar{l}_0 — среднее значение случайной хорды в шаре объема V . Объединяя (17) и (18), имеем двухстороннюю оценку для значения \bar{l} .

Таблица 1

Значение величин a, b, c (для эллипсоида полуоси, для параллелепипеда стороны)	Значение величины l' (для эллипсоида и для параллелепипеда)	Значение величины l_0 (для эллипсоида и параллелепипеда)	Среднее значение величины \bar{l} для параллелепипеда
$a=1, b=1, c=1$	0, 7737 1, 106	1, 3333 1, 6349	1, 3333
1; 0, 75; 0, 75	0, 6247 0, 9370	1, 1006 1, 3661	1, 0908
1; 0,75; 0,25	0, 5121 0, 7682	0, 9615 1, 1933	0, 9230
1; 0,75; 0,5	0, 3078 0, 4615	0, 7631 0, 9472	0, 6316
1; 0,5; 0,5	0, 4444 0, 6666	0,8399 1,0342	0, 8000
1; 0,5; 0,25	0, 2909 0, 4364	0, 6666 0, 8276	0, 5714
1; 0,25; 0,25	0, 2321 0, 3481	0, 5291 0, 6567	0, 4444

$$l' < \bar{l} < \bar{l}_0. \quad (19)$$

Приведем значение величины \bar{l}_0 , соответствующее телам элементарной формы. В частности, для эллипсоида с полуосями a, b, c имеем

$$\bar{l}_0 = \frac{4}{3} \sqrt[3]{abc}, \quad (20)$$

для куба с ребром a

$$\bar{l}_0 = \left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{2}{3}} \pi^{-\frac{1}{3}} a. \quad (21)$$

и для параллелепипеда со сторонами a, b, c

$$\bar{l}_0 = \left(\frac{4}{3}\right)^{-\frac{2}{3}} \pi^{-\frac{1}{3}} \sqrt[3]{abc}. \quad (22)$$

Об эффективности полученных оценок можно судить по численным примерам из табл. 1.

На примере (табл. 1) параллелепипеда, для которого \bar{l} определяется весьма просто из (11), видно, что истинное значение \bar{l} при изменении соотношения размеров тела может быть ближе к l' или \bar{l}_0 . Если тело более вытянуто, то \bar{l} ближе к l' , если все размеры тела ближе друг к другу, \bar{l} ближе к \bar{l}_0 . Если учесть, что вычисление значений \bar{l} для выпуклого тела является весьма трудоемким и сложным, особенно это касается моментов более высокого порядка, то приведенные оценки можно считать вполне удовлетворительными для практических целей. Это особенно относится к величине \bar{l}_0 , так как при изучении вероятностно-геометрических моделей случайных сред, как правило, приходится прибегать к модели заполнения пространства шарами [1]. Если же требуются более точные оценки значений \bar{l} и ее моментов, то они могут быть получены путем цифрового моделирования на ЭЦВМ геометрической модели пересечения случайной линией выпуклого тела. В этих задачах метод статистических испытаний является, очевидно, единственным универсальным методом.

ЛИТЕРАТУРА

1. М. Г. Kendall, Р. Moran. Geometrical probability. London. 1963.
 2. В. Бляшке. Круг и шар. «Наука». М., 1967.
-