

**О КАНАЛОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ КОМПЛЕКСОВ  
ОКРУЖНОСТЕЙ В ТРЕХМЕРНОМ ЕВКЛИДОВОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ**

М. Р. ВАЙНТРУБ

(Представлена кафедрой высшей математики)

1. В [1] доказано, что комплексы окружностей в трехмерном конформном пространстве обладают тремя, в общем случае различными, семействами канальных поверхностей.

Ниже рассматривается вопрос о существовании семейств канальных поверхностей, проходящих через окружности комплексов в трехмерном евклидовом пространстве.

2. Рассмотрим в трехмерном евклидовом пространстве  $E_3$  трехпараметрическое многообразие окружностей, плоскости которых образуют  $h$ -параметрическое,  $h=1, 2, 3$ , семейство (комплекс  $\{h, 3\}$ ). Присоединим к каждой окружности этого комплекса локальный ортонормированный репер  $(\bar{A}, \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ , начало  $\bar{A}$  и векторы  $\bar{e}_1, \bar{e}_2$  которого поместим в плоскости окружности. Инфинитезимальное перемещение репера определяется уравнениями:

$$d\bar{A} = \omega^a \bar{e}_a, d\bar{e}_a = \omega_a^b \bar{e}_b, a, b, c = 1, 2, 3. \quad (1)$$

где

$$\omega_a^b = -\omega_b^a \quad (2)$$

и формы Пфаффа  $\omega^a, \omega_a^b$  удовлетворяют структурным уравнениям Картана [2]:

$$D\omega^a = [\omega^c \omega_c^a], D\omega_a^b = [\omega_a^c \omega_c^b]. \quad (3)$$

Поместим начало  $\bar{A}$  репера в центр текущей окружности комплекса. Тогда уравнения этой окружности относительно таким образом выбранного репера запишутся в виде:

$$(x^1)^2 + (x^2)^2 + 2a_0 = 0, \quad x^3 = 0. \quad (4)$$

Система уравнений окружности, смежной к (4) относительно репера  $(\bar{A}, \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ , записывается в виде:

$$(x^1 + dx^1)^2 + (x^2 + dx^2)^2 + 2(a_0 + da_0) = 0, \quad (5)$$

$$x^3 + dx^3 = 0.$$

Требуя, чтобы уравнения (4) и (5) определяли одну и ту же окружность и определяя при этом дифференциалы  $dx^a$  из условий стационарности [3]

$$dx^a = -x^b \omega_b^a - \omega^a \quad (6)$$

точки евклидова пространства, убеждаемся, что шесть форм Пфаффа  $\omega^i, \omega_j^i, \omega^3, \theta^0 \equiv da_0, i, j=1, 2$ , являются первичными формами окруж-

ности в  $E_3$ . Три формы Пфаффа  $\omega^1, \omega^2, \omega^3$  определяют положение плоскости окружности в пространстве.

3. В дальнейшем будем считать, что  $\omega^i \equiv \Theta^i, -R\Theta^0 \equiv \Theta^3, \omega^i_{\alpha'} \equiv \omega^i_{\alpha}$  индексы  $\alpha, \beta$  принимают  $h$  определенных значений из чисел 1, 2, 3; индексы  $\alpha', \beta'$  принимают все оставшиеся значения из этой совокупности чисел.

Так как рассматривается комплекс окружностей  $\{h, 3\}$ , то среди шести первичных форм Пфаффа  $\omega^{\alpha}, \Theta^{\alpha}$  имеется  $h$  линейно независимых форм, определяющих положение плоскости окружности комплекса. Пусть это будут формы  $\omega^{\alpha}$ . В качестве остальных  $(3-h)$  линейно-независимых форм комплекса примем формы  $\Theta^{\alpha'}$ . Тогда система дифференциальных уравнений комплекса  $\{h, 3\}$  запишется в виде:

$$\omega^{\alpha'} = A_{\beta}^{\alpha'} \omega^{\beta}, \Theta^{\alpha} = B_{\beta}^{\alpha} \omega^{\beta} + C_{\beta'}^{\alpha} \Theta^{\beta'}. \quad (7)$$

4. Имеет место следующая теорема.

*Теорема.* Комплекс окружностей  $\{h, 3\}$  в трехмерном евклидовом пространстве  $E^3$  обладает  $h$ , в общем случае различными, семействами каналовых поверхностей.

*Доказательство.* Пусть комплекс  $\{h, 3\}$  отнесен к своему каноническому реперу [4]. Задавая два соотношения между независимыми формами  $\omega^{\alpha}, \Theta^{\alpha'}$  мы выделяем некоторое однопараметрическое подмногообразие, проходящее через окружность комплекса. Если это подмногообразие является семейством каналовых поверхностей, то две бесконечно близкие точки  $M$  и  $M'$  окружности лежат (при смещении окружности в каналовой поверхности) на одной и той же сфере с центром в некоторой точке

$$\bar{F} = \bar{A} + \rho \bar{e}_3, \quad (8)$$

то есть

$$(\bar{M} - \bar{F}, d\bar{M}) = 0. \quad (9)$$

Положение произвольной точки  $\bar{M}$  окружности комплекса будем определять с помощью угла  $\varphi$ , который образует радиус-вектор  $\bar{AM}$  с осью  $\bar{e}_1$ :

$$\bar{M} = \bar{A} + R(\bar{e}_1 \cos \varphi + \bar{e}_2 \sin \varphi). \quad (10)$$

Учитывая, что

$$\begin{aligned} dM = & \bar{e}_1 \{ \Theta^1 + dR \cos \varphi - R \sin \varphi d\varphi - R \omega_1^2 \sin \varphi \} + \\ & + \bar{e}_2 \{ \Theta^2 + dR \sin \varphi + R \cos \varphi d\varphi + R \omega_1^2 \cos \varphi \} + \\ & + \bar{e}_3 \{ \omega^3 - R \omega^1 \cos \varphi - R \omega^2 \sin \varphi \} \end{aligned} \quad (11)$$

условие (9) можно записать в виде:

$$R(\Theta^2 - \rho \omega^2) \sin \varphi + R(\Theta^1 - \rho \omega^1) \cos \varphi + \rho \omega^3 - \Theta^3 = 0. \quad (12)$$

Уравнения (12) должны удовлетворяться тождественно относительно  $\varphi$ . Следовательно, коэффициенты при  $\sin \varphi, \cos \varphi$  и свободный член должны равняться нулю:

$$\Theta^{\alpha} - \rho \omega^{\alpha} = 0. \quad (13)$$

Подставляя значения  $\omega^{\alpha'}$  и  $\Theta^{\alpha}$  из (7), будем иметь:

$$\begin{aligned} \Theta^{\alpha'} - \rho A_{\beta}^{\alpha'} \omega^{\beta} &= 0, \\ C_{\beta'}^{\alpha} \Theta^{\beta'} + B_{\beta}^{\alpha} \omega^{\beta} - \rho \omega^{\alpha} &= 0. \end{aligned} \quad (14)$$

Исключая из уравнений (14) отношение линейно-независимых форм Пфаффа, получаем уравнение

$$\begin{vmatrix} B_1^1 - \rho & \dots & B_h^1 \\ \dots & \dots & \dots \\ B_1^h & \dots & B_h^h - \rho \end{vmatrix} = 0 \quad (15)$$

степень  $h$  относительно  $\rho$ .

Теорема доказана.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Р. М. Гейдельман. К теории трехпараметрического комплекса окружностей. ДАН СССР, № 2, 201—204, 1954.
2. С. П. Фиников. Метод внешних форм Картана. М.—Л., 1948.
3. Г. Ф. Лаптев. Дифференциальная геометрия погруженных многообразий. Тр. Моск. мат. об-ва, т. 2, 275—382, 1953.
4. М. Р. Вайнтриб. Дифференциальная геометрия  $m$ -параметрических многообразий окружностей в евклидовом пространстве. Материалы III межвузовской конференции по проблемам геометрии, Казань, 27, 1967.