

## ВЫЧИСЛЕНИЕ ГАММА-ФУНКЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ

В. Е. КОРНИЛОВ

(Представлена кафедрой высшей математики)

В статье получено обобщение известных формул, представляющих функции  $\psi(1+z)$  и  $\ln \Gamma(1+z)$  степенными рядами. Бесконечные степенные ряды, входящие в состав этих формул, представляются цепными дробями с положительными членами звеньев. Если эти степенные ряды заменить суммой подходящей дроби и остаточного члена, то тогда модуль остаточного члена меньше модуля разности двух подходящих дробей, индексы которых отличаются на целое нечетное число. Эта оценка справедлива в некоторой области комплексного переменного  $z$ .

1. Если в равенстве ([1], стр. 60)

$$\psi(1+z) = -\gamma + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{z+n} \right), \quad \gamma = 0,577... \quad (1)$$

воспользоваться разложением

$$\frac{1}{\kappa} - \frac{1}{z+\kappa} = \frac{z}{\kappa^2} - \frac{z^2}{\kappa^3} + \frac{z^3}{\kappa^4} - \dots, \quad |z| < \kappa,$$

то получим

$$\begin{aligned} \psi(1+z) = & -\gamma + \sum_{n=1}^{\kappa-1} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{z+n} \right) + \\ & + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \zeta(n, \kappa) z^{n-1}, \quad |z| < \kappa, \end{aligned} \quad (2)$$

где

$$\zeta(n, \kappa) = \sum_{m=\kappa}^{\infty} \frac{1}{m^n}. \quad (3)$$

Интегрируя равенство (2), находим ([1], стр. 30, (1))

$$\begin{aligned} \ln \Gamma(1+z) = & -\gamma z + \sum_{n=1}^{\kappa-1} \left[ \frac{z}{n} - \ln \left( 1 + \frac{z}{n} \right) \right] + \\ & + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \zeta(n, \kappa) \frac{z^n}{n}, \quad |z| < \kappa. \end{aligned} \quad (4)$$

После потенцирования получим

$$\Gamma(1+z) = e^{-\gamma z} \prod_{n=1}^{\kappa-1} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^{-1} \cdot e^{z:n} \times \\ \times \exp \left[ \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \zeta(n, \kappa) \frac{z^n}{n} \right], \quad \kappa = 1, 2, \dots \quad (5)$$

В равенстве (5)  $z$  заменим на  $-z$  и разделим его на новое равенство, затем применим тождество  $\pi z = \Gamma(1+z)\Gamma(1-z)\sin \pi z$  и после элементарных преобразований окончательно получим

$$\Gamma(1+z) = e^{-\gamma z} \sqrt{\frac{\pi z}{\sin \pi z}} \prod \sqrt{\frac{n-z}{n+z}} e^{z:n} \times \\ \times \exp \left[ - \sum_{n=1}^{\infty} \zeta(2n+1, \kappa) \frac{z^{2n+1}}{2n+1} \right], \quad |z| < \kappa, \quad \kappa = 1, 2, \dots \quad (6)$$

При  $\kappa \rightarrow \infty$  имеем

$$\Gamma(1+z) = e^{-\gamma z} \sqrt{\frac{\pi z}{\sin \pi z}} \prod_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n-z}{n+z}} e^{z:n}, \quad |z| < \infty. \quad (7)$$

При  $z = 1, 2, \dots$  в правой части равенства (7) необходимо перейти к пределу.

Степенной ряд в равенстве (5) представляется цепной дробью с положительными членами звеньев [2, 3] и для него остаточный член по модулю меньше модуля разности двух подходящих дробей, разность индексов которых равна нечетному числу, в области  $\operatorname{Re} z \leq 0$  [3]. Аналогичная цепная дробь может быть получена и для степенного ряда (6) ([4], задача 1220) здесь соответствующая оценка остаточного члена имеет в области

$$\frac{\pi}{4} < |\arg z^2| < \frac{3}{4} \pi.$$

Представления функций, аналогичные равенствам (2), (4)–(6), можно получить для гиперболических и тригонометрических функций, логарифмов этих функций и для интегралов от любой из перечисленных функций и для интегралов от произведения любой из этих функций на различные степени переменной интегрирования. Полученные при таком преобразовании степенные ряды представляются цепными дробями с положительными членами звеньев, и для них справедливы аналогичные оценки остаточных членов по модулю.

2. Обобщенная дзета-функция Римана (3) представляется интегралом от тригонометрических и гиперболических функций [2], поэтому здесь уместно будет кратко изложить вопрос о применении цепных дробей к вычислению тригонометрических рядов.

При разложении тригонометрического ряда по степеням  $e^{ix}$  или  $e^{-ix}$  его можно рассматривать как обыкновенный степенной ряд. Такой ряд почти всегда можно или непосредственно представлять цепной дробью с положительными членами звеньев, или представить несколькими суммами бесконечных рядов, каждый из которых представляется цепной дробью с положительными членами звеньев. Исключением являются тригонометрические ряды, у которых коэффициенты содержат множители функции вида  $\sin n\lambda$ ,  $\cos n\lambda$ . Однако и такие ряды преобразуются в конечное число сумм бесконечных рядов, обладающих указанным выше

свойством, если тригонометрические функции  $\sin n\lambda$ ,  $\cos n\lambda$  заменить показательными функциями по формулам Эйлера и применить преобразования, которые аналогичны преобразованиям наиболее простых тригонометрических рядов.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Г. Бейтмен и А. Эрдейи. Высшие трансцендентные функции (гипергеометрическая функция, функции Лежандра). М., Физматгиз, 1965.
  2. В. Е. Корнилов. Приложение цепных дробей к вычислению дзета-функции Римана. Изв. ТПИ, т. 245.
  3. В. Е. Корнилов. Приложение цепных дробей к вычислению обобщенных гипергеометрических функций. Изв. ТПИ, т. 205, 1972.
  4. И. В. Проскуряков. Сборник задач по линейной алгебре. М., Гостехиздат, 1957.
-