

ТОЧНОЕ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОЕ РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО ЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Б. Ф. КРУТОЙ

(Представлена научным семинаром кафедры инженерной и вычислительной математики)

Дано обыкновенное линейное дифференциальное уравнение 2-го порядка

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = f(x) \quad (1)$$

с краевыми условиями

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = A \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B \end{cases} \quad (2)$$

в точках a, b оси Ox (рис. 1). Коэффициенты $p(x), q(x)$ и свободный член $f(x)$ уравнения (1) будем считать непрерывными функциями от x на отрезке $a \leq x \leq b$. Требуется при этих условиях найти решение $y(x)$ краевой задачи (1), (2), учитывая, что тогда функция $y(x)$ и ее производные $y'(x), y''(x)$ будут непрерывными на отрезке $a \leq x \leq b$.




Рис. 1. Области применения разложений (28), (29) и (30) для расчета y'_s и y''_s .

Мы поставим своей целью найти численное решение указанной краевой задачи, определив значения $y_s = y(x_s)$ в $n+1$ равноотстоящих

точках x_s отрезка $[a, b]$, включая его концы $a=x_0$ и $b=x_n$. Таким образом, если мы обозначим через h цену одного деления отрезка $[a, b]$ при его разбиении на n равных частей

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{x_n - x_0}{n}, \quad (3)$$

то соответствующие точки x_s отрезка $[a, b] = [x_0, x_n]$ определим так:

$$x = x_0 + sh, \quad (s=0, 1, 2, \dots, n). \quad (4)$$

Предположим теперь, что для $n-1$ внутренних точек x_s , ($s=1, 2, \dots, n-1$), отрезка $[x_0, x_n]$, задаваемых согласно (3)–(4), мы написали $n-1$ равенств, получаемых при подстановке $x=x_s$ в дифференциальное уравнение (1). Присоединяя сюда еще два крайевых условия (2), мы получим свод из $n+1$ алгебраических уравнений 1-й степени

$$\begin{aligned} 1) \quad & y''(x_s) + p(x_s)y'(x_s) + q(x_s)y(x_s) = f(x_s), \\ & (s=1, 2, \dots, n-1) \\ 2) \quad & \alpha_0 y(x_0) + \alpha_1 y'(x_0) = A, \\ & \beta_0 y(x_n) + \beta_1 y'(x_n) = B \end{aligned} \quad (5)$$

с $3(n+1)$ неизвестными $y_s = y(x_s)$, $y'_s = y'(x_s)$, $y''_s = y''(x_s)$ в $n+1$ точках $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$ отрезка $[x_0, x_n]$.

Так как в своде уравнений (5) число $3(n+1)$ неизвестных y_s, y'_s и y''_s , где $s=0, 1, 2, \dots, n-1, n$, в 3 раза превышает количество $n+1$ самих уравнений, то из этого свода указанная совокупность неизвестных y_s, y'_s, y''_s не может быть найдена даже грубо, если не привлечь для этой цели способ наименьших квадратов.

Однако есть простой путь избавиться в своде (5) от $2(n+1)$ неизвестных y'_s, y''_s , если взять достаточно большое число делений n отрезка $[x_0, x_n]$ и учесть, что тогда производные $y' = y'(x_s)$ и $y'' = y''(x_s)$ могут быть с высокой степенью точности выражены через значения $y_x = y(x_x)$, где $x=0, 1, 2, \dots, n-1, n$. Покажем, как это сделать.

Прежде всего заметим, что если точка x оси Ox лежит на отрезке $[x_0, x_n]$ и, значит, $x_0 \leq x \leq x_n$, то эта же точка x удовлетворяет и более узкому условию $x_s \leq x \leq x_{s+1} = x_s + h$. Последнее условие равносильно соотношениям

$$1) \quad 0 \leq \xi \leq h, \quad 2) \quad x = x_s + \xi, \quad 3) \quad x_{s+1} = x_s + h, \quad (6)$$

откуда вытекает, что тогда можно написать

$$1) \quad y(x) = y(x_s + \xi), \quad 2) \quad y(x_{s+1}) = y(x_s + h). \quad (7)$$

Введем далее конечно-разностные операторы $E, \Delta, \delta, \mu, \nabla$, определив их равенствами [1]:

$$\begin{aligned} 1) \quad & y(x_{s+1}) = y(x_s + h) = E^h y(x_s), \quad y(x_{s-1}) = y(x_s - h) = E^{-h} y(x_s), \\ & 2) \quad y(x) = y(x_s + \xi) = E^\xi y(x_s), \\ 3) \quad & y(x_{s+1}) - y(x_s) = y(x_s + h) - y(x_s) = E^h y(x_s) - y(x_s) = (E^h - 1)y(x_s), \\ 4) \quad & y(x_s) - y(x_{s-1}) = y(x_s) - y(x_s - h) = y(x_s) - E^{-h} y(x_s) = (1 - E^{-h})y(x_s), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& 5) y(x_{s-1}) - y(x_s) = (E^h - 1)y(x_s) = \Delta y(x_s), \quad (8) \\
6) y(x_{s+1}) - y(x_s) &= (E^h - 1)y(x_s) \delta y(x_{s+\frac{1}{2}}) = \delta y\left(x_s + \frac{h}{2}\right) = \delta E^{\frac{h}{2}} y(x_s), \\
7) y(x_s) - y(x_{s-1}) &= (1 - E^{-h})y(x_s) = \delta y(x_{s-\frac{1}{2}}) = \delta y\left(x_s - \frac{h}{2}\right) = \delta E^{-\frac{h}{2}} y(x_s) \\
8) \frac{1}{2} [y(x_{s+\frac{1}{2}})y(x_{s-\frac{1}{2}})] &= \frac{1}{2} \left[y\left(x_s + \frac{h}{2}\right) + y\left(x_s - \frac{h}{2}\right) \right] = \\
&= \frac{1}{2} (E^{\frac{h}{2}} + E^{-\frac{h}{2}}) y(x_s) = \mu y(x_s), \\
9) y(x_s) - y(x_{s-1}) &= (1 - E^{-h})y(x_s) = \nabla y(x_s).
\end{aligned}$$

Из равенств (8) вытекают следующие соотношения между указанными операторами:

$$\begin{aligned}
1) 1 + \Delta + E^h, \quad 2) (1 - \nabla) &= E^{-h}, \quad 3) \delta E^{\frac{h}{2}} = (E^h - 1) = \Delta, \\
4) \delta E^{-\frac{h}{2}} &= (1 - E^{-h}) = \nabla, \quad 5) \delta = E^{\frac{h}{2}} - E^{-\frac{h}{2}}, \\
6) (1 + \Delta)(1 - \nabla) &= 1 \quad 7) \mu = \frac{1}{2} (E^{\frac{h}{2}} + E^{-\frac{h}{2}}).
\end{aligned}$$

Используя найденные связи между операторами E , Δ , ∇ , δ и μ , напомним нужные нам представления для $y(x) = y(x_s + \xi)$ через нисходящие $\Delta^\nu y_s$, центральные $\delta^\nu y_s$ и восходящие $\nabla^\nu y_s$ конечные разности с точностью до членов 6-го порядка малости. С этой целью приведем предварительно соотношение (6.1) к виду

$$\frac{0}{h} = 0 \leq \frac{\xi}{h} = t \leq \frac{h}{h} = 1$$

и затем примем $t = \frac{\xi}{h}$ в качестве нового переменного. Таким образом, мы получим следующие соотношения для ξ и t :

$$1) \xi = th, \quad 2) 0 \leq \xi \leq h, \quad 3) 0 \leq t \leq 1. \quad (10)$$

Теперь мы можем написать с точностью до членов 6-го порядка малости, что:

$$\begin{aligned}
1) y(x) = y(x_s + \xi) &= E^\xi y(x_s) = E^{th} y(x_s) = (E^h)^t y(x_s) = \\
&= (1 + \Delta)^t y_s = [1 + (t)_1 \Delta + (t)_2 \Delta^2 + (t)_3 \Delta^3 + (t)_4 \Delta^4 + (t)_5 \Delta^5 + (t)_6 \Delta^6] y_s
\end{aligned}$$

и, следовательно,

$$y(x_s + \xi) = y_{s+t} = (1 + \Delta)^t y_s \approx \sum_{\nu=0}^6 (t)_\nu \Delta^\nu y_s, \quad (11)$$

где обозначено

$$(t)_\nu = \frac{t(t-1)\dots[t-(\nu-1)]}{\nu!}; \quad (t)_0 = 1; \quad (12)$$

$$\begin{aligned}
2) \quad y(x_s + \xi) = y_{s+t} = y_s + \frac{1}{2} t (\delta y_{s+1/2} + \delta y_{s-1/2}) + \frac{t^2}{2!} \delta^2 y_s + \\
+ \frac{1}{2} \frac{t(t^2-1)}{3!} (\delta^3 y_{s+1/2} + \delta^3 y_{s-1/2}) + \frac{t^2(t^2-1)}{4!} \delta^4 y_s + \\
+ \frac{1}{2} \frac{t(t^2-1)(t^2-4)}{5!} (\delta^5 y_{s+1/2} + \delta^5 y_{s-1/2}) + \frac{t^2(t^2-1)(t^2-4)}{6!} \delta^6 y_s = \\
= y_s + t \mu \delta y_s + \frac{t^2}{2!} \delta^2 y_s + \frac{t(t^2-1)}{3!} \mu \delta^3 y_s + \frac{t^2(t^2-1)}{4!} \delta^4 y_s + \\
+ \frac{t(t^2-1)(t^2-4)}{5!} \mu \delta^5 y_s + \frac{t^2(t^2-1)(t^2-4)}{6!} \delta^6 y_s;
\end{aligned} \tag{13}$$

$$\begin{aligned}
3) \quad y(x) = y(x_s - \xi) = E^{-\xi} y(x_s) = (E^{-h})^t y(x_s) = \\
= y_{s-t} = (1 - \nabla)^t y_s = \sum_{v=0}^6 (-1)^v (t)_v \nabla^v y_s,
\end{aligned} \tag{14}$$

где коэффициенты (t) определяются согласно (12).

Заметим, что представления (11) и (13) для $y(x_s + \xi) = y_{s+t}$ и $y(x_s - \xi) = y_{s-t}$ называются разложениями Ньютона по нисходящим $\Delta^v y_s$ и восходящим $\nabla^v y_s$ конечным разностям. Вывод этих разложений очевиден.

Что касается представления (12) для $y(x_s + \xi) = y_{s+t}$, то оно называется разложением Стирлинга по центральным разностям $\delta^v y_{s+x}$ и получается довольно сложным путем. Чтобы получить это разложение, нужно сначала построить диаграмму Фразера [2] для нисходящих разностей $\Delta^v y_x$. Затем по этой диаграмме напишем разложения Гаусса по верхней и нижней змейкам, после чего пересчитаем разности $\Delta^v y_x$ на разности $\delta^v y_x$, пользуясь соотношением (4.5). Тогда мы получим следующие два разложения Гаусса для $y(x_s + \xi) = y_{s+t}$:

$$\begin{aligned}
1) \quad y(x_s + \xi) = y_{s+t} = y_s + (t)_1 \delta y_{s-\frac{1}{2}} + (t+1)_2 \delta^2 y_s + \\
+ (t+1)_3 \delta^3 y_{s-\frac{1}{2}} + (t+2)_4 \delta^4 y_s + (t+2)_5 \delta^5 y_{s-\frac{1}{2}} + (t+3)_6 \delta^6 y_s;
\end{aligned} \tag{14}$$

$$\begin{aligned}
2) \quad y(x_s + \xi) = y_{s+t} = y_s + (t)_1 \delta y_{s+\frac{1}{2}} + (t)_2 \delta^2 y_s + \\
+ (t+1)_3 \delta^3 y_{s+\frac{1}{2}} + (t+1)_4 \delta^4 y_s + (t+2)_5 \delta^5 y_{s+\frac{1}{2}} + (t+2)_6 \delta^6 y_s.
\end{aligned} \tag{15}$$

Полусумма $\frac{1}{2} [(14) + (15)]$ этих разложений Гаусса дает после простых преобразований разложение Стирлинга (12).

Вернемся снова к разложениям (11) — (13). Наша цель — получить из них ряды для расчета y'_s и y''_s , входящих в краевую задачу (1) — (2), представленную в конечно-разностном виде (5). Чтобы построить такие ряды для y'_s и y''_s , мы поступим следующим образом.

Выражение первой производной y'_s для всех трех разложений (11) — (13) получим по общему правилу, а именно:

$$1) \quad y'_s = y'(x_s) = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{y(x_s + \xi) - y(x_s)}{\xi} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{y(x_s + th) - y(x_s)}{th}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{th} \left[t \Delta + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!} \Delta^3 + \dots + \frac{t(t-1)\dots(t-5)}{6!} \Delta^6 \right] y_s,$$

или окончательно

$$y'_s = y'(x_s) = \left(\frac{dy}{dt} \right)_{y=y_s} = \frac{1}{h} \left(\Delta - \frac{1}{2} \Delta^2 + \frac{1}{3} \Delta^3 - \frac{1}{4} \Delta^4 + \frac{1}{5} \Delta^5 - \frac{1}{6} \Delta^6 \right) y_s = D y_s. \quad (16)$$

$$\begin{aligned} 2) \quad y'_s = y'(x_s) &= \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{y(x_s + \xi) - y(x_s)}{\xi} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{y(x_s + th) - y(x_s)}{th} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{th} \left[t \mu \delta y_s + \frac{t^2}{2!} \delta^2 y_s + \frac{t(t^2-1)}{3!} \mu \delta^3 y_s + \frac{t^2(t^2-1)}{4!} \delta^4 y_s + \right. \\ &\quad \left. + \frac{t(t^2-1)(t^2-4)}{5!} \mu \delta^5 y_s + \frac{t^2(t^2-1)(t^2-4)}{6!} \delta^6 y_s \right] \end{aligned}$$

или окончательно

$$y'_s = y'(x_s) = \frac{1}{h} \left(\mu \delta y_s - \frac{1}{6} \mu \delta^3 y_s + \frac{1}{30} \mu \delta^5 y_s \right) = D y_s. \quad (17)$$

$$\begin{aligned} 3) \quad y'_s = y'(x_s) &= \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{y(x_s - \xi) - y(x_s)}{-\xi} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{y(x_s - th) - y(x_s)}{-th} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{-th} \left[-t \nabla + \frac{t(t+1)}{2!} \nabla^2 - \frac{t(t-1)(t-2)}{3!} \nabla^3 + \dots + \frac{t(t-1)\dots(t-5)}{6!} \nabla^6 \right] y_s. \end{aligned}$$

или окончательно

$$y'_s = y'(x_s) = \left(\frac{dy}{dt} \right)_{y=y_s} = \frac{1}{h} \left(\nabla + \frac{1}{2} \nabla^2 + \frac{1}{3} \nabla^3 + \frac{1}{4} \nabla^4 + \frac{1}{5} \nabla^5 + \frac{1}{6} \nabla^6 \right) y_s = D y_s. \quad (18)$$

Чтобы от разложений (16)–(18) для y'_s перейти к разложениям для y''_s , введем оператор дифференцирования D :

$$D = \frac{d}{dt}, \quad (19)$$

откуда вытекает далее, что

$$\frac{d^x}{dt^x} = \left(\frac{d}{dt} \right)^x = D^x,$$

и, значит

$$y_s^{(x)} = \left(\frac{d^x y}{dt^x} \right)_{y=y_s} = D^x y_s. \quad (20)$$

Таким образом, в частности,

$$y_s'' = \left(\frac{d^2 y}{dt^2} \right)_{y=y_s} = D^2 y_s = (DD) y_s. \quad (21)$$

Исходя теперь из разложений (16) — (18) для $y'_s = Dy_s$ и используя оператор дифференцирования D , получим следующие три выражения для y''_s с точностью до членов 6-го порядка малости:

$$1) y''_s = y''(x_s) = D^2 y_s = \frac{1}{h^2} \left(\Delta - \frac{1}{2} \Delta^2 + \frac{1}{3} \Delta^3 - \frac{1}{4} \Delta^4 + \frac{1}{5} \Delta^5 - \frac{1}{6} \Delta^6 \right)^2 y_s,$$

или окончательно

$$y''_s = \frac{1}{h^2} \left(\Delta^2 - \Delta^3 + \frac{11}{12} \Delta^4 - \frac{5}{6} \Delta^5 + \frac{137}{180} \Delta^6 \right) y_s; \quad (21)$$

$$2) y''_s = y''(x_s) = D^2 y_s = \frac{1}{h^2} \left(\mu \delta - \frac{1}{6} \mu \delta^3 + \frac{1}{30} \mu \delta^5 \right)^2 y_s = \\ = \frac{1}{h^2} \left(\mu^2 \delta^2 - \frac{1}{3} \mu^2 \delta^4 + \frac{17}{180} \mu^2 \delta^6 \right) y_s; \quad (*)$$

$$3) y''_s = y''(x_s) = D^2 y_s = \frac{1}{h^2} \left(\nabla + \frac{1}{2} \nabla^2 + \frac{1}{3} \nabla^3 + \frac{1}{4} \nabla^4 + \frac{1}{5} \nabla^5 + \frac{1}{6} \nabla^6 \right)^2 y_s.$$

или окончательно

$$y''_s = \frac{1}{h^2} \left(\nabla^2 + \nabla^3 + \frac{11}{12} \nabla^4 + \frac{5}{6} \nabla^5 + \frac{137}{180} \nabla^6 \right) y_s. \quad (22)$$

Конечно-разностные выражения (21), (22) для y''_s имеют окончательный вид. Выражение же (*) для y''_s мы преобразуем, выразив в нем μ^2 через δ^2 с помощью соотношений (9.5) и (9.7). Опираясь на эти соотношения, получим при $h=1$:

$$1) \mu = \frac{1}{2} (E^{\frac{1}{2}} + E^{-\frac{1}{2}}), \quad 2) \delta = E^{\frac{1}{2}} - E^{-\frac{1}{2}}, \quad 3) \delta^2 = E + E^{-1} - 2,$$

$$4) \mu^2 = \frac{1}{4} (E + E^{-1} + 2) = \frac{1}{4} [(E + E^{-1} - 2) + 4] = \\ = \frac{1}{4} (E + E^{-1} - 2) + 1 = \frac{1}{4} \delta^2 + 1.$$

Следовательно,

$$\mu^2 = \frac{1}{4} \delta^2 + 1. \quad (23)$$

Заменяя далее в (*) множитель μ^2 его выражением (23) через δ^2 , найдем ещё одно конечно-разностное выражение для y''_s :

$$y''_s = y''(x_s) = \frac{1}{h^2} \left[\delta^2 - \frac{1}{12} \delta^4 + \frac{1}{90} \delta^6 \right] y_s. \quad (24)$$

В заключение нам нужно полученные конечно-разностные разложения (16) — (18) и (21), (24), (22) для y'_s и y''_s выразить непосредственно через y_x ($x=0, 1, 2, \dots, n$). Это можно выполнить с помощью

соотношений (9.1)–(9.3) для операторов E , Δ , ∇ , δ , которые при $h=1$ дают

$$1) \Delta E=1, \quad 2) \delta=E^{\frac{1}{2}}-E^{-\frac{1}{2}} \quad 3) \Delta=1-E^{-1}. \quad (25)$$

Из этих соотношений следует далее, что

$$1) \Delta^{\nu} y_s=(E-1)^{\nu} y_s, \quad 2) \delta^{\nu} y_x=(E^{\frac{\nu}{2}}-E^{-\frac{\nu}{2}}) y_x, \quad 3) \nabla^{\nu} y_s=(1-E^{-1})^{\nu} y_s \quad (26)$$

Если учесть еще смысл преобразования (8.3), выполняемого оператором E над y_s , y_x при $h=1$

$$1) E^{\lambda} y_s=y_{s+\lambda}, \quad 2) E^{\pm \frac{\mu}{2}} y_x=y_{x \pm \frac{1}{2} \mu}, \quad 3) E^{-\lambda} y_s=y_{s-\lambda}, \quad (27)$$

то мы получим следующие выражения y'_s , y''_s через y_x , ($x=0, 1, 2, \dots, n$), вытекающие из (16) и (21), (17) и (24), (18) и (22):

$$(A) \left\{ \begin{array}{l} 1) y'_s = \frac{1}{60h} [-147 y_s + 360 y_{s+1} - 450 y_{s+2} + 400 y_{s+3} - \\ \quad - 225 y_{s+4} + 72 y_{s+5} - 10 y_{s+6}] \\ 2) y''_s = \frac{1}{180h^2} [812 y_s - 3132 y_{s+1} + 5265 y_{s+2} - 5080 y_{s+3} + \\ \quad + 2970 y_{s+4} - 972 y_{s+5} + 137 y_{s+6}]. \end{array} \right. \quad (28)$$

$$(B) \left\{ \begin{array}{l} 1) y'_s = \frac{1}{60h} [y_{s+3} - 9 y_{s+2} + 45 y_{s+1} - 45 y_{s-1} + 9 y_{s-2} - y_{s-3}]. \\ 2) y''_s = \frac{1}{180h^2} [2 y_{s+3} - 27 y_{s+2} + 270 y_{s+1} - 490 y_s + \\ \quad + 270 y_{s-1} - 27 y_{s-2} + 2 y_{s-3}]. \end{array} \right. \quad (29)$$

$$(B) \left\{ \begin{array}{l} 1) y'_s = \frac{1}{60h} [147 y_s - 360 y_{s-1} + 450 y_{s-2} - 400 y_{s-3} + \\ \quad + 225 y_{s-4} - 72 y_{s-5} + 10 y_{s-6}]. \\ 2) y''_s = \frac{1}{180h^2} [812 y_s - 3132 y_{s-1} + 5265 y_{s-2} - 5080 y_{s-3} + \\ \quad + 2970 y_{s-4} - 972 y_{s-5} + 137 y_{s-6}]. \end{array} \right. \quad (30)$$

Разложения (28) применяем для расчета y'_s и y''_s при $s=0, 1, 2$. С помощью разложений (29) выражаем y'_s и y''_s при $s=3, 4, \dots, n-3$. Наконец, разложения (30) служат нам для расчета y'_s и y''_s при $s=n-2, n-1, n$ (рис. 1).

Подстановка разложений (28)–(30) для y'_s и y''_s в свод (5) из $(n+1)$ уравнений с $3(n+1)$ неизвестными y_s , y'_s , y''_s превращает его в свод из $(n+1)$ алгебраических уравнений первой степени с $n+1$ неизвестными y_x ($x=0, 1, 2, \dots, n$):

$$\left\{ \begin{array}{l} 1) \sum_{x=0}^n b_{1x} y_x = A \\ 2) \sum_{x=0}^n b_{sx} y_x = 0, \quad (s=1, 2, \dots, n-1). \\ 3) \sum_{x=n}^0 b_{nx} y_x = B \end{array} \right. \quad (31)$$

Так как выражения (28)—(30) для производных y'_s , y''_s даны с высокой степенью точности, то с такой же примерно высокой степенью точности будут получены и значения y_s из решения свода уравнений (31) на ЦВМ. По этой же самой причине значения y_s из решения свода (31) будут найдены с достаточной точностью даже при сравнительно редкой сети соответствующих точек x_s на оси Ox .

ЛИТЕРАТУРА

1. Э. Д. Бут. Численные методы. М., Физматгиз, 1959.
2. Э. Уиттэкер и Г. Робинсон. Математическая обработка результатов наблюдений. М.-Л., ОНТИ, 1935.
3. Б. П. Демидович и др. Численные методы анализа. М., Физматгиз, 1963.
4. Л. Коллатц. Задачи на собственные значения. М., «Наука», 1968.