УДК 550.89

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КАЛГУТИНСКОЙ РУДНО-МАГМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ЮЖНЫЙ АЛТАЙ)

И.Ю. Анникова, А.Г. Владимиров, С.А. Выставной, А.Н. Василевский, Л.В. Витте*, Е.Н. Мороз

Институт геологии СО РАН. г. Новосибирск E-mail: ira99@uiggm.nsc.ru *Институт геофизики СО РАН. г. Новосибирск

Приведены новые данные по тектонической позиции, глубинной морфологии, внутреннему строению, возрасту и истории формирования Калгутинского редкометалльно-гранитного массива и связанного с ним одноименного редкометалльно-молибденвольфрамового месторождения.

Калгутинская рудно-магматическая система (РМС), представленная одноменным редкометалльно-гранитным массивом, дайковым поясом онгонитов-эльванов и крупным редкометалльно-молибден-вольфрамовым месторождением (рис. 1), начиная с середины 30-х годов прошлого столетия и до настоящего времени, является объектом пристального внимания многих исследователей (М.С. Баклаков, А.С. Калугин, Р.А. Котляров, М.Г. Русанов, Н.М. Кужельный, Н.Н. Амшинский, Е.И. Никитина, А.А. Оболенский, В.И. Сотников, Н.И. Тимофеев, В.Б. Дергачев, И.Ю. Анникова, А.Г. Владимиров, С.А. Выставной, Л.П. Рихванов, А.А. Поцелуев, А.В. Титов и др.). За этот период времени накоплен большой комплекс данных по возрасту, истории формирования и тектонической позиции Калгутинского редкометалльно-гранитного гранитного массива, его глубинной морфологии, а также термобарогеохимии и изотопной систематике Sr, Nd и Pb.

Редкометалльные граниты южной части Горного Алтая традиционно коррелировались с гранитами калбинского типа в Восточном Казахстане и на этом основании им приписывался пермский возраст [1–4]. Эта точка зрения была пересмотрена в последние годы, в первую очередь, благодаря мультисистемному изотопному датированию пород и минералов [5-11]. С учетом этих геохронологических данных (U-Pb, Rb-Sr и Ar-Ar), а также прямых геологических наблюдений предлагается следующая схема эволюции редкометалльных рудно-магматических систем южной части Горного Алтая (таблица). Анализ этой таблицы показывает, что в пределах Холзунско-Чуйского поднятия (юг Горного Алтая) необходимо выделять, по крайней мере, три существенно автономных очаговых ареала: Бухтарминский (Кунгурджаринский), Калгутинский и Чиндагатуйский (Алахинский), в каждом из которых магматизм и связанное с ним эндогенное оруденение имеют специфический характер, что, по-видимому, обусловлено отличием в составе гранитообразующего субстрата и степенью взаимодействия с мантийным источником.

Редкометалльные граниты, представленные крупными батолитами, в различных очаговых ареалах близки по петрохимическому и редкоэлементному составу, в то время как магматические породы завершающих стадий, отвечающие остаточным ультраредкометалльным очагам, резко различаются [10, 12, 13]. В Бухтарминском (Кунгурджаринском) и Чиндагатуйском (Алахинском) очаговых ареалах они представлены предельными дифференциатами редкометалльно-гранитной магмы без прямых признаков участия мантийного источника, в Калгутинском очаговом ареале – характеризуются аномально повышенными концентрациями фосфора (до 0,96 %), кроме того, здесь обнаружены высокотемпературные фельзит-порфиры [14]. Эти данные указывают на взаимодействие остаточных ультраредкометалльных очагов с мантийными расплавами.

Необходимо особо подчеркнуть, что для Бухтарминского и Чиндагатуйского очаговых ареалов, включая сопредельные территории Восточного Казахстана и Китая, характерна Li-Ta(±Be) и W-Sn минерализация; для Калгутинского очагового ареала, включая сопредельные территории Монголии и Китая, – Мо-W(±Ве) минерализация. Присутствие или отсутствие молибдена в рудно-магматических системах является важным критерием различия очаговых ареалов. Учитывая мантийный генезис классических молибден-порфировых месторождений, этот признак также свидетельствует о существенном влиянии мантийного источника на ультраредкометалльные остаточные очаги. Очевидно, что с этим фактором связана специфика (уникальность) Калгутинского редкометалльно-молибден-вольфрамового рудного поля.

Рассмотренная выше схема районирования южной части Горного Алтая с позиции выделения трех гранитных очаговых ареалов, металлогеническая специализация которых отражает роль мантийного источника, находит прямое подтверждение при анализе глубинной морфологии, внутреннего строения, эволюции и специфики состава Калгутинской редкометалльно-гранитной РМС.

Глубинная морфология Калгутинского редкометалльно-гранитного массива была определена на основе карт гравитационного поля: остаточных аномалий силы тяжести ($\Delta g_{oct} = \Delta g_{Ha6n} - \Delta g_h = 10$ км) масштаба 1:200 000, регионального фона масштаба 1:500 000 ($\Delta g_h = 10$ км), карт изодинам масштаба 1:50 000 Калгутинского района. Расчеты моделей проводились по Δg_{Ha6n} , полученному суммированием значений регионального фона и остаточных аномалий. Методика моделирования гравитационных и магнитных аномалий была основана на комплексном подходе к интерпретации данных гравиметрии, магнитометрии, сейсморазведки и геологии [15–17]. Результаты моделирования гравитационных аномалий по главным профилям (рис. 2) сводятся к следующим выводам:

- В центральной части массива установлена "ножка" шириной 1...2 км, протягивающаяся в СВ направлении и падающая на ЮВ под углом 45...60°.
- К СЗ от центральной части массива и глубокозалегающей под ней "ножки" граниты слагают пластообразное тело мощностью 6...9 км с резким обрывом на границе Калгутинской вулкано-плутонической структуры.



Рис. 1. Схематическая геологическая карта Калгутинского редкометалльно-гранитного массива (составлена по данным Б.Г. Семенцова с авторскими дополнениями): 1) четвертичные отложения; 2) девонские вулканогенно-осадочные отложения нерасчлененные; 3—5) восточно-калгутинский комплекс Т₃—J₁vk (3) дайки эльванов и онгонитов, 4) субвулканические штоки гранит-порфиров, 5) микрограниты, грейзенизированные микрограниты, кварц-мусковитовые грейзены "Молибденового штока"); 6—10) калгутинский гранит-лейкогранитный комплекс Т₂₋₃kl: фазы дополнительных интрузий (6) резкопорфировидные двуслюдяные лейкограниты, 7) порфировидные и/или неравномернозернистые двуслюдяные лейкограниты, 8) крупнозернистые мусковитовые граниты), главная интрузивная фаза (9) порфировидные двуслюдяные граниты, 10) порфировидные биотитовые граниты); 11) границы геологические (а) интрузивные, б) фациальные)

 К ЮВ от центральной части массива и глубокозалегающей под ней "ножкой" граниты слагают сложное по конфигурации тело, которое можно интепретировать как серию крутопадающих на ЮВ блоков с контрастно уменьшающейся мощностью гранитов до 3...4 км.

Таблица.	Эволюция	редкометалльных	рудно-магматичес-
	ких систем Южного Алтая		

Бухтарминская РМС (240235 млн лет)				
Комплекс	Бухтарминский гранит- лейкогранитный (γ-һд7₂) 235±9 (Rb-Sr), 240±1 (Ar-Ar)			
Месторождение, тип и масштабы оруденения	Магматический; сподумен- содержащие аплиты; масштабы оруденения не известны, перспективный объект для поисков			
Кал	гутинская РМС (220210 мл	н лет)		
Комплекс	Калгутинский гранит- лейкогранитный (үңТ ₂₋₃ -J,KI)			
Месторождение, тип и масштабы оруденения	Калгутинское рудное поле; гидротермальный; кварц-вольфрамит- сульфидные жилы, 213±2,4 (Ar-Ar)			
Чиндагатуйска	Восточно- Калгутинская РМС (205200 млн лет)			
Комплекс	Чиндагатуйский гранит- лейкогранитный (ү-ŀylǎn) 195,5±1,8 (Ar-Ar), 192±1,6 (Ar-Ar), 193±0,8 (Ar-Ar)	Восточно- калгутинский комплекс (утц\vk) 204±7,8 (Ar-Ar), 203,4±1,5 (Ar-Ar), 202,4±0,8 (Ar-Ar)		
Месторождение, тип и масштабы оруденения	а) Чиндагатуйское м-ние; гидротермальный; убогие кварц-вольфрамит- сульфидные жилы; отрабо- тано; б) Алахинское м-ние; маг- матический; сподуменовые гранит-порфиры с ураган- ными содержаниями Li ₂ O; крупный промышленный объект 198,6±1,2 (Rb-Sr)	Калгутинское рудное поле; гидротермальный; богатые кварц- вольфрамит- молибденит- берилловые жилы; крупный промыш- ленный объект		

В строении Калгутинского массива выделяются два самостоятельных интрузивных ритма (комплекса): Калгутинский гранит-лейкогранитный комплекс мезо- и гипабиссальной фации глубинности (γ-lγT₂₋₃-J1 kl), слагающий более 90 % от общей площади массива, включает:

- γ ΓΦ₁ T_{2.3}kl порфировидные средне- и крупнозернистые биотитовые граниты с эндоконтактовой фацией меланогранитов;
- *l*γ ΦДИ₂ T_{2:3}kl резкопорфировидные турмалинсодержащие биотит-мусковитовые лейкограниты с мелкозернистой основной массой (*l*γ ΦДИ¹₂); крупно- и неравномернозернистые мусковитовые лейкограниты (*l*γ ΦДИ²₂) и биотит-мусковитовые крупнозернистые лейкограниты (*l*γ ΦДИ³₂);

- *lγ-γπ* 3Φ₃ T₂₋₃kl – мусковитовые гранит-порфиры, аплитовидные граниты, аплиты, аплитопегматиты и пегматиты.

Восточно-калгутинский комплекс даек, малых интрузий и трубок взрыва субвулканической фации глубинности (T₃-J₁vk) включает:

- γπ₁ T₃-J₁νk молибденитсодержащие флюидноэксплозивные брекчии микрогранитов и микрогранит-порфиров;
- γπ₂ T₃-J₁vk апатит- и флюоритсодержащие гранит-порфиры, эльваны, редко онгониты повышенной редкометалльности;
- γπ₃ T₃-J₁νk ультраредкометалльные апатитсодержащие онгониты и эльваны.

Ранний интрузивный ритм представляет собой "стандартную" гранит-лейкогранитную ассоциацию повышенной редкометалльности, которая в сравнении с геохимическим типом редкометалльных плюмазитовых гранитов (по Л.В. Таусону), имеет повышенные концентрации P, Cs, Mo,W, Sr, Ba и пониженные – F и Sn. Поздний интрузивный ритм резко отличается от "классических" (по В.И. Коваленко) онгонитов и эльванов. Гранит-порфиры, онгониты и эльваны, обладая повышенной и высокой редкометалльностью, не содержат топаза, вместо которого кристаллизуются флюорит и апатит. Отмечаются аномальные по цезиеносности разности онгонитов (до 1800 г/т), а также фельзит-порфиры гибридного корово-мантийного происхождения, аномально перегретые и содержащие необычно высокие для онгонитов концентрации CaO, Cr и Ni. Изотопная систематика пород и руд (Sr, Nd, Pb) указывает на возрастание мантийной компоненты в источнике при переходе от гранит-лейкогранитов раннего ритма к онгонитам и эльванам позднего ритма [13].

Обобщая геолого-геофизические и структурногеологические данные, можно предложить следующую геолого-геофизическую (геодинамическую) модель формирования Калгутинской РМС. В раннем мезозое, т.е. на внутриплитном этапе тектогенеза, южная часть Горного Алтая испытала интенсивные разрывные деформации, которые заложили ортогональную сетку разрывных нарушений СВ-ЮЗ и ЮВ-СЗ простираний. Эта сетка разломов испытала деформацию в результате интенсивного сжатия СВ направления, что выразилось в сдвиговзбросовых движениях, и одновременно она была осложнена левосдвиговыми деформациями. Гранитоидные расплавы внедрялись на фоне периодически возобновляющихся деформаций, используя тектонически наиболее ослабленные зоны (главные плоскости взбросо-сдвигов и трещины отрыва).

На раннем этапе (220...215 млн лет) первичная гранит-лейкогранитная магма сформировала трещинную интрузию Z-образной формы. Текстурноструктурный облик и эволюция состава гранитов раннего ритма Калгутинского массива контролировались кристаллизационной дифференциацией. На позднем этапе (205...200 млн лет) произошла дефор-



Рис. 2. Результаты моделирования гравитационных аномалий по профилям, пересекающим Калгутинский гранитный массив и соответствующий ему центр гравитационого минимума

мация гранитного массива в результате взбросовосдвиговых движений. Внедрение онгонитов, эльванов и рудных жил контролировалось субвертикальными трещинами отрыва, возникшими в результате взбросовой тектоники и вскрывшими глубинный нижнекоровый очаг. Формирование ультраредкометалльных даек и продуктивного Мо-W оруденения

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Амшинский Н.Н. Вертикальная петрогеохимическая зональность гранитоидных плутонов. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1973. — 200 с.
- Амшинский Н.Н., Врублевский В.А., Кононов В.Н. и др. Состояние изученности и расчленение пород Алтая, Салаира и Томь-Колыванской складчатой зоны на комплексы. Л.: Недра, 1978. 45 с.
- Морозов О.А. Калий-аргоновое датирование разнофазных образований Калгутинского гранитного массива (Горный Алтай) // Известия АН СССР. – Сер. геол. – 1986. – № 10. – С. 145–149.
- Лузгин Б.Н. Пространственная модель оруденения Калгутинского рудного района (Горный Алтай) // Советская геология. – 1988. – № 8. – С. 94–97.
- Козлов М.С., Халилов В.А., Стасенко Н.В., Тимкин В.И. Юрская лейкогранит-гранитовая формация Алтая // Геология и геофизика. – 1991. – № 8. – С. 43–52.
- Ильин В.А., Халилов В.А., Козлов М.С. и др. О возрасте Алахинского штока Горного Алтая по данным U-Pb и Rb-Sr датирования // Геология и геофизика. — 1994. — № 1. — С. 79—81.
- Владимиров А.Г., Пономарева А.П., Шокальский С.П. и др. Позднепалеозойский-раннемезозойский гранитоидный магматизм Алтая // Геология и геофизика. — 1997. —№ 4. —С. 715—729.
- Kostitsyn Yu.A., Vystavnoi S.A., Vladimirov A.G. Age and genesis of the spodumene-bearing granites of the SW Altai (Russia): an iso-

контролировалось двумя факторами: 1) кристаллизационной дифференциацией родоначальной гранит-лейкогранитной магмы повышенной редкометалльности, 2) взаимодействием остаточных кремнекислых расплавов с мантийными магмами щелочно-базальтового и/или лампрофирового состава.

topic and geochemical study // Acta Universitatis Carolinae. – Geologica. – 1998. – V. 42(1). – P. 60–63.

- Vladimirov A.G., Vystavnoy S.A., Kruk N.N., Titov A.V., Annikova I.Yu., Moroz E.N. The South-Chuya Ridge and the Ukok Plateau (southern part of Gorny Altai) // Continental grows in the phanerozoic: evidence from Central Asia. Third Workshop. Geology, magmatism and metamorphism of the western part of Altai-Sayan fold region. Field excursion guide. Novosibirsk, Russia, 2001. P. 118–128.
- Владимиров А.Г., Выставной С.А., Титов А.В., Руднев С.Н. и др. Петрология раннемезозойских редкометалльных гранитов юга Горного Алтая: вклад в проблему происхождения расплавов, аномально обогащенных редкими щелочами и фосфором // Геология и геофизика. – 1998. – Т. 39. – № 7. – С. 901–916.
- Vystavnoy S.A., Titov A.V., Annikova I.Yu. Intracontinental granites of Southern Altai and associated rare-metal mineralization // Continental grows in the phanerozoic: evidence from Central Asia. Abstracts. – Ulaanbaatar, Mongolia, 1999. – P. 68–73.
- Шокальский С.П., Бабин Г.А., Владимиров А.Г. и др. Корреляция магматических и метаморфических комплексов западной части Алтае-Саянской складчатой области. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. — 190 с.
- Анникова И.Ю. Редкометалльные граниты, онгониты и эльваны Калгутинского массива, Южный Алтай (состав, связь с оруденением, петрогенетическая модель формирования): Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. — Новосибирск, 2003. — 20 с.

- Титов А.В., Владимиров А.Г., Выставной С.А., Поспелова Л.Н. Необычные высокотемпературные фельзит-порфиры в постгранитном дайковом поясе Калгутинского редкометалльно-гранитного массива (Горный Алтай) // Геохимия. — 2001. — № 6. — С. 677—682.
- Василевский А.Н. Применение метода подбора при моделировании региональных геологических структур // Геология и геофизика. — 1980. — № 3. — С. 41—52.
- Витте Л.В. Типы континентальной земной коры и история их развития. — Новосибирск: Наука, 1981. — 236 с.
- Витте Л.В., Василевский А.Н. К вопросу о тектонической позиции и формах проявлений в коре щелочно-ультраосновного магматизма Сибирской платформы // Геология и геофизика. — 1988. — № 5. — С. 73—85.

УДК 550.831.05 (571.1)

СЕЙСМОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ КАРТИРОВАНИИ ВЫСОКОЁМКИХ КОЛЛЕКТОРОВ. II. РОЛЬ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТИ В ФОРМЕ ПАЛЕОРЕЛЬЕФА И ФОРМИРОВАНИИ ПРОНИЦАЕМЫХ ЯЧЕЙ КОЛЛЕКТОРОВ

В.Н. Устинова, В.Г. Устинов

Томский государственный университет E-mail: ustinova@ggf.tsu.ru

Решение литолого-фациальных задач на месторождениях нефти и газа может быть существенно дополнено результатами морфоструктурного анализа сейсмических поверхностей. Для изучения условий формирования, фациального типа коллектора, прогноза напряжённо-деформированных зон на поднятиях, определяющих ёмкостные свойства коллекторов, новые возможности открывает морфоструктурный анализ на основе типизации морфоформ и изучения связи характера распределения тектонических напряжений на поднятиях с типом структур.

Важной стороной интерпретационного процесса, при решении литолого-фациальных задач по данным сейсморазведки, является классификация форм рельефа палеоповерхностей. Детальные реконструкции палеорельефа, в том числе с использованием 3D-сейсморазведки, кроме возможности картирования и анализа фаций позволяют получать сведения о характере распределения тектонических напряжений на поднятии, картировать с применением различных методов морфоструктурного и морфотектонического анализа тектонические нарушения, зоны тектонической трещиноватости. Начиная с анализа рельефа, следует прибегнуть к разработанным для форм рельефа классификациям. Рельеф, как известно, классифицируется по морфологическим, ландшафтно-геологическим, тектоническим и др. признакам. Классификационные схемы рельефа, нашедшие применение при решении историко-геологических, геотектонических, геоморфологических задач, предложены Н.А. Флоренсовым, И.П. Герасимовым, Д.А. Тимофеевым, А.Н. Ласточкиным и др., имеют важное практическое значение, позволяют разрабатывать собственные схемы элементаризации и обобщения форм рельефа для решения практических задач нефтегазовой отрасли.

Устойчивость, повторяемость форм палеорельефа позволила авторам статьи, с опорой на имеющиеся представления о задачах и методах ранжирования морфоформ, создать собственную классификацию (рис. 1), разработанную, в первую очередь, с целью изучения особенностей и характера проявления в палеорельефе фаций песчаных отложений – потенциальных коллекторов, роли тектонической трещиноватости в формировании облика рельефа и зон высокоёмких коллекторов.

Геометрический облик структур тесно связан и во многом определяется наличием и пространственной ориентировкой систем тектонических напряжений, тектонических трещин. Каким образом эти системы трещин ведут себя в полях сейсмических параметров? На временных сейсмических разрезах трещиноватость проявляется в виде зон поглощения, "грабенообразных" смещений осей синфазности. Более уверенно эти системы трещин выявляются в рельефе палеоповерхности. Достаточно контрастно, в виде систем ортогональных разнопорядковых трещин, проявляется регматическая трещиноватость. Эта трещиноватость, участвуя в формировании структурных поверхностей, проявляется, в первую очередь, в избирательности ориентировок структур и их элементов (рис. 1, тип 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11). В пределах Западно-Сибирской плиты выявляется четыре преобладающих ориентировки в системах трещин: северо-западные, северо-восточные, субмеридиональные и широтные, которые определяют строение рельефа. Согласно классификации С.С. Шульца [1], можно выявить несколько порядков тектонических трещин, ограничивающих вложенные блоки характерной размерности. Кроме размерности, пространственной ориентировки, тектоническая трещиноватость характеризуется глубиной проникновения. Согласно исследованиям К.И. Микуленко и др.