

ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО ЧЛЕНА Е-ФУНКЦИИ МАК-РОБЕРТА

В. Е. КОРНИЛОВ

(Представлена кафедрой высшей математики)

В этой статье изучается вопрос об оценке по модулю Е-функции Мак-Роберта [1] для комплексного переменного в области $\operatorname{Re} z \geq 0$.

1. Пусть параметры Е-функции Мак-Роберта ([1], стр. 200)

$$E = (\alpha_1, \dots, \alpha_p, 1: \rho_1, \dots, \rho_q: z) = E[z] = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\Gamma(\alpha_1 + m) \dots \Gamma(\alpha_p + m)}{\Gamma(\rho_1 + m) \dots \Gamma(\rho_q + m)} \left(-\frac{1}{z}\right)^m, \quad p \geq q + 1 \quad (1)$$

удовлетворяют следующим неравенствам:

$$\begin{aligned} \alpha_1 > \dots > \alpha_p > 1, \quad \rho_1 > \dots > \rho_q; \\ \alpha_{p-q+1} < \rho_1 \leq 2\alpha_{p-q+1}, \dots, \alpha_p < \rho_q \leq 2\alpha_p; \end{aligned} \quad (2)$$

тогда для функции (1) имеет место теорема.

Теорема. Модуль Е-функции Мак-Роберта (1), параметры которой удовлетворяют неравенствам (2), для $\operatorname{Re} z \geq 0$ меньше следующей суммы:

$$\begin{aligned} |E[z]| < \frac{\Gamma(\alpha_1) \dots \Gamma(\alpha_p)}{\Gamma(\rho_1) \dots \Gamma(\rho_q)} \left[1 + \frac{\alpha_1 \dots \alpha_p}{\rho_1 \dots \rho_q z} \right] + \\ + \sum_{m=1}^{p-q} \frac{|z|(\rho_1 - 1) \dots (\rho_q - 1)}{\alpha_1 \dots \alpha_m (\alpha_m - 1) \dots (\alpha_p - 1)} + \\ + \sum_{m=1}^q \frac{(\rho_m - \alpha_{p-q+m}) \rho_1 \dots \rho_m (\rho_{m+1} - 1) \dots (\rho_q - 1)}{2|z| \alpha_1 \dots \alpha_{p-q+m} (\alpha_{p-q+m+1} - 1) \dots (\alpha_p - 1)} \left| \frac{\rho_1 \dots \rho_{m-1} z}{\alpha_1 \dots \alpha_{p-q+m-1}} + \frac{1}{2} \right|^{-1} \\ \cdot \left| \frac{\rho_1 \dots \rho_m z}{\alpha_1 \dots \alpha_{p-q+m}} + 1 \right|^2. \end{aligned} \quad (3)$$

Доказательство. На основании ([1], стр. 201 (3) и стр. 72 (10), (12)) представим Е-функцию Мак-Роберта (1) кратным интегралом

$$E[z] = I_p = \frac{1}{\Gamma(\rho_1 - \alpha_{p-q+1}) \dots \Gamma(\rho_q - \alpha_p)} \int_0^1 t^{\alpha_p-1} \times$$

$$\begin{aligned} & \times (1-t)^{\rho q - \alpha p - 1} dt \dots \int_0^1 s^{\alpha p - q + 1 - 1} (1-s)^{\rho_1 - \alpha p - q + 1 - 1} ds \times \\ & \times \int_0^\infty r^{\alpha p - q - 1} e^{-r} dr \dots \int_0^\infty v^{\alpha_1 - 1} \left(1 + \frac{v \dots t}{z}\right)^{-1} e^{-v} dv. \end{aligned} \quad (4)$$

Последний интеграл равенства (4) ввиду ([2], стр. 144) и ([3]), стр. 28) представим в виде суммы подходящей дроби и функционального ряда:

$$E[z] = I_{p-1} \Gamma(\alpha_1) \left[\left(1 + \frac{\alpha_1}{z_1}\right)^{-1} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{m! z_1}{(\alpha_1)_{m+1} Q_{2m}(z_1) Q_{2m+2}(z_1)} \right]; \quad (5)$$

$$z_1 = \frac{z}{\alpha_1 w \dots t}, \quad (\alpha_m) = \frac{\Gamma(a+m)}{\Gamma(a)}.$$

Модуль второго слагаемого правой части равенства (5) вычисляется до конца и равен $\frac{|z|(\rho_1 - 1) \dots (\rho_q - 1)}{\alpha_1(\alpha_1 - 1) \dots (\alpha_p - 1)}$ ввиду того, что для $\text{Re} z \geq 0$ в статье ([3], стр. 28) получено

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{m!}{(\alpha_1)_{m+1} |Q_{2m}(z) Q_{2m+2}(z)|} < \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(2)_m}{(\alpha_1)_{m+2}} = \frac{1}{(\alpha_1 - 1)_2}. \quad (6)$$

Модуль первого слагаемого правой части равенства (5), если отбросить множитель $\Gamma(\alpha_1)$, равен модулю следующей Е-функции:

$$|I_{p-1}| = \left| E\left(\alpha_2, \dots, \alpha_p, 1; \rho_1, \dots, \rho_q; \frac{z}{\alpha_1}\right) \right|. \quad (7)$$

Последний интеграл вида (5) функции (7) опять разложим в цепную дробь и представим двумя слагаемыми согласно равенству (5) и т. д. После $p-q$ -кратной замены интегралов вида (5) двумя слагаемыми согласно равенства (5) и полного интегрирования вторых слагаемых получим

$$\begin{aligned} & J_{q-1} \int_0^1 s^{\alpha p - q + 1 - 1} (1-s)^{\rho_1 - \alpha p - q + 1 - 1} \left(1 - \frac{\alpha_1 \dots \alpha_{p-q} s \dots t}{z}\right)^{-1} ds = \\ & = J_{q-1} \frac{\Gamma(\alpha_{p-q+1}) \Gamma(\rho_1 - \alpha_{p-q+1})}{\Gamma(\rho_1)} \left[\left(1 - \frac{\alpha_1 \dots \alpha_{p-q+1} u \dots t}{\rho_1 z}\right)^{-1} + \right. \\ & \quad \left. + \frac{z}{\alpha_1 \dots \alpha_{p-q} u \dots t} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\rho_1 - \alpha_{p-q+1})_m m! (\alpha_{p-q+1})_m}{(\rho_1)_{2m} (\rho_1 + m - 1)_m (Q_{2m} Q_{2m+2}} \right], \end{aligned} \quad (8)$$

так как последний интеграл левой части равенства (8) ввиду ([4], стр. 312 (3)) и ([5], стр. 21) представляется подходящей дробью и остатком в виде функционального ряда.

Модуль второго слагаемого равенства (8) вычисляется до конца и ввиду неравенств (2), равенства (4), ([5], стр. 24) и неравенств (12) равен следующему выражению:

$$\gamma_1 = \frac{2|z|(\rho_1 - \alpha_{p-q+1})\rho_1(\rho_2 - 1) \dots (\rho_q - 1) \left| \frac{z}{\alpha_1 \dots \alpha_{p-q}} + \frac{1}{2} \right|^{-1}}{3\alpha_1 \dots \alpha_{p-q+1}(\alpha_{p-q+2} - 1) \dots (\alpha_p - 1) \left| \frac{\rho_1 z}{\alpha_1 \dots \alpha_{p-q+1}} + 1 \right|^2} \quad (9)$$

Модуль первого слагаемого равенства (8), если отбросить множитель $\frac{\Gamma(\alpha_1) \dots \Gamma(\alpha_{p-q+1})}{\Gamma(\rho_1)}$, равен модулю следующей Е-функции

$$|I_{q-1}| = \left| E \left(\alpha_{p-q+2}, \dots, \alpha_p, 1 : \rho_2, \dots, \rho_q : \frac{\rho_1 z}{\alpha_1 \dots \alpha_{p-q+1}} \right) \right|. \quad (10)$$

Внутренний интеграл функции (10) также разложим в цепную дробь и представим двумя слагаемыми согласно правой части равенства (8) и т. д. После $q-1$ -кратной замены интегралов вида (8) двумя слагаемыми и полного интегрирования всех слагаемых с учетом равенств (8) и (9) окончательно получим равенство (3), что и требовалось доказать.

2. Докажем теорему о неравенстве многочленов.

Теорема. Если корни многочлена $Q_{2k+2}(z)$ разделяются корнями многочлена $Q_{2k}(z)$, т. е.

$$\begin{aligned} Q_{2\kappa}(z) &= (z + \beta_1) \dots (z + \beta_\kappa), \\ Q_{2\kappa+2}(z) &= (z + \alpha_1) \dots (z + \alpha_{\kappa+1}), \quad \kappa = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (11)$$

$$\beta_0 = \alpha_1 > \beta_1 > \alpha_2 > \dots > \alpha_K > \beta_K > \alpha_{K+1} = \beta_{K+1} > 0,$$

ТО ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТИХ МНОГОЧЛЕНОВ ИМЕЕТ МЕСТО НЕРАВЕНСТВО

$$\begin{aligned} |Q_{2\kappa+2}(z)| &\geq |Q_{2\kappa}(z)| |z + \alpha|, \quad \alpha_1 \dots \alpha_{\kappa+1} = \beta_1 \dots \beta_{\kappa} \alpha, \\ \operatorname{Re} z &\geq 0, \quad \alpha_1 > \alpha > \alpha_{\kappa+1}. \end{aligned} \quad (12)$$

Доказательство. Непосредственным вычислением нетрудно доказать, что неравенство (12) справедливо для двух множителей, т. е.

$$|z+c||z+d| \geq |z+a||z+b|, \quad ab=cd, \quad 0 < a \leq b < d, \quad \operatorname{Re} z \geq 0. \quad (13)$$

Пусть $\beta_{l-1} > \alpha > \beta_l$, $l = 1, \dots, \kappa + 1$, тогда на основании неравенств (11) и (12) получим следующие неравенства:

$$\begin{aligned} & |z + \alpha_1| |z + \alpha_2| \geqslant |z + \beta_1| \left| z + \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\beta_1} \right|, \quad \left(\alpha_1 > \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\beta_1} > \alpha_2 \right); \\ & \dots\dots\dots \\ & \left| z + \frac{\alpha_1 \dots \alpha_l}{\beta_1 \dots \beta_{l-1}} \right| |z + \alpha_{l+1}| \geqslant \left| z + \alpha \frac{\beta_l \dots \beta_\kappa}{\alpha_{l+2} \dots \alpha_{\kappa+1}} \right|, \\ & \left(\frac{\alpha_1 \dots \alpha_l}{\beta_1 \dots \beta_{l-1}} > \frac{\alpha_1 \dots \alpha_{l+1}}{\beta_1 \dots \beta_{l-1} \alpha} = \frac{\beta_l \dots \beta_\kappa}{\alpha_{l+2} \dots \alpha_{\kappa+1}} > \beta_l \right); \\ & \dots\dots\dots \\ & \left| z + \frac{\beta_{\kappa-1} \beta_\kappa}{\alpha_{\kappa+1}} \right| |z + \alpha_{\kappa+1}| \geqslant |z + \beta_{\kappa-1}| |z + \beta_\kappa|, \\ & \left(\frac{\beta_{\kappa-1} \beta_\kappa}{\alpha_{\kappa+1}} > \beta_{\kappa-1} > \beta_\kappa > \alpha_{\kappa+1} \right). \end{aligned} \tag{14}$$

Перемножая левые и правые части неравенств (14) и сокращая обе части полученного неравенства на равные множители, мы получим необходимое неравенство (12), что и требовалось доказать.

3. Для Е-функции имеет место следующее рекуррентное соотношение:

$$E(\alpha_1, \dots, \alpha_p; \rho_1, \dots, \rho_q; z) = s_{\kappa-1}(z) + R_{\kappa-1}(z) =$$

$$= s_{\kappa-1}(z) + \left(-\frac{1}{z}\right)^{\kappa} E(\alpha_1 + \kappa, \dots, \alpha_p + \kappa, 1; \rho_1 + \kappa, \dots, \rho_q + \kappa, 1 + \kappa; z).$$

Соотношение (15) легко проверяется путем подстановки ряда (1) вместо Е-функций и сравнение коэффициентов в левой и правой частях равенства при одинаковых степенях z^{-n} , где $n = \kappa, \kappa+1, \dots$. Если параметры функции, расположенной в правой части равенства (15), удовлетворяют неравенствам (2), то формулу (3) можно применить для оценки этой функции, а это равнозначно оценке остаточного члена $R_{k-1}(z)$ частичной суммы S_{k-1} функции (15).

Функция Ломмеля ([5], стр. 50 (72)) представлена следующей функцией Мак-Роберта:

$$S_{\mu, \nu}(z) = \frac{z^{\mu-1} E\left(\frac{1-\nu-\mu}{2}, \frac{1+\nu-\mu}{2}, 1::\frac{z}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-\nu-\mu}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1+\nu-\mu}{2}\right)},$$

$$-2 \leq \mu < -1, 0 \leq \nu < 1, \nu + \mu < -1. \quad (16)$$

Ввиду равенств (3), (15), и (16) функцию Ломмеля можно представить суммой отрезка ряда (1) и остаточного члена:

$$S_{\mu, \nu}(z) = z^{\mu-1} \sigma_{\kappa-1}\left(\frac{z^2}{4}\right) + \left(\frac{4}{|z|^2}\right)^{\kappa} |z|^{\mu-1} \left(\frac{1-\nu-\mu}{2}\right)_{\kappa} \left(\frac{1+\nu-\mu}{2}\right)_{\kappa} \times$$

$$\times \left[\frac{1}{1 + \frac{(2\kappa-1-\mu)^2 - \nu^2}{z^2}} + \frac{|z|^2(2\kappa-\mu)}{4\left(\frac{-1+\nu-\mu}{2} + \kappa\right)_2 \left(\frac{-1-\nu-\mu}{2} + \kappa\right)_2} \right]. \quad (17)$$

Например, в равенстве (17) для $\mu = -2, \nu = 0, z = 20, \kappa = 9$ остаточный член $\Delta_9 < 0.00000000015$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Г. Бейтман и А. Эрдейи. Высшие трансцендентные функции (гипергеометрическая функция, функция Лежандра). М., Физматгиз, 1965.
2. А. Н. Хованский. Приложение цепных дробей и их обобщений к вопросам приближенного анализа. М., ГИТТЛ, 1956.
3. В. Е. Корнилов. Применение цепных дробей к вычислению некоторых интегралов. Изв. ТПИ, т. 131, стр. 26—30, Томск, 1965.
4. Н. Н. Лебедев. Специальные функции и их приложения. М., Гостехиздат, 1953.
5. В. Е. Корнилов. Приложение цепных дробей к вычислению интегралов от биномных дифференциалов. Изв. ТПИ, т. 131, стр. 21—25, Томск, 1965.
6. Г. Бейтман и А. Эрдейи. Высшие трансцендентные функции (функции Бесселя, функции параболического цилиндра, ортогональные многочлены). М., Физматгиз, 1966.