

**РЕШЕНИЕ ПО СПОСОБУ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДВУМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПОСОБА НА УРАВНЕНИЯ,
НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ**

Б. Ф. КРУТОЙ

(Представлена научным семинаром кафедры инженерной и вычислительной математики)

Дано уравнение Пуассона для плоской замкнутой, многосвязной вообще области $\bar{D}^{(2)} = D^{(2)} + r$:

$$\Delta u(x, y) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y), \quad (1)$$

с краевым условием

$$\bar{u} = u(x, y) = h(x, y) \quad (2)$$

на границе R области $\bar{D}^{(2)}$ (рис. 1).

Заменим искомую функцию $u(x, y)$ ее приближенным представлением $\varphi(x, y)$ в виде разложения

$$u(x, y) \approx \varphi(x, y) = \sum_{x=0}^m c_x \varphi_x(x, y) \quad (3)$$

по некоторым выбранным нами опорным взаимонезависимым функциям $\varphi_x(x, y)$, где c_x — неизвестные коэффициенты.

Для определения коэффициентов c_x зададим μ каких-нибудь точек \bar{M}_s на границе R и ν каких-нибудь точек M_t внутри области $\bar{D}^{(2)}$ (рис. 1), причем потребуем, чтобы

$$\mu + \nu = n > m + 1 = \bar{m}, \quad (4)$$

Тогда для границы r мы можем написать μ уравнений ошибок вида, вытекающего из (2), (3):

$$\sum_{x=0}^m c_x \varphi_x(x_s, y_s) - h(x_s, y_s) = \varepsilon_s, \quad (5)$$

$$s = 1, 2, \dots, \mu,$$

где ε_s — соответствующие ошибки этих уравнений. Для внутренней же области $D^{(2)}$ можем написать ν уравнений ошибок вида, вытекающего из (1), (3):

$$\sum_{x=0}^m \left(\frac{\partial^2 \varphi_x(x_t, y_t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_x(x_t, y_t)}{\partial y^2} \right) - f(x_t, y_t) = \varepsilon_t, \quad (6)$$

($t=1, 2, \dots, \nu$)

где ε_t — ошибки уравнений (6).

Введем обозначения

$$\begin{aligned} 1) \varphi_x(x_s, y_s) &= a_{sx}, & 2) h(x_s, y_s) &= h_s, \\ 3) \frac{\partial^2 \varphi_x(x_t, y_t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_x(x_t, y_t)}{\partial y^2} &= b_{tx}, & 4) f(x_t, y_t) &= f_t. \end{aligned} \quad (7)$$




Рис. 1. Область $\bar{D}^{(2)} \cup \Gamma$, внутренние M^t и граничные M_s опорные точки для функции $u(x, y) = u(M)$.

В обозначениях (7) объединенный свод из $\mu + \nu = n$ уравнений ошибок (5), (6) запишется так

$$\begin{cases} \sum_{x=0}^m a_{sx} c_x - h_s = \varepsilon_s, (s=1, 2, \dots, \mu), (\mu + \nu = n < m + 1 = \bar{m}) \\ \sum_{x=0}^m b_{tx} c_x - f_t = \varepsilon_t, (t=1, 2, \dots, \nu) \end{cases} \quad (8)$$

или в матричном виде

$$\begin{cases} a_{(\mu, \bar{m})} c_{(\bar{m}1)} - h_{(\mu 1)} = \varepsilon_{(\mu 1)} \\ b_{(\nu, \bar{m})} c_{(\bar{m}1)} - f_{(\nu 1)} = \varepsilon_{(\nu 1)} \end{cases} \quad (\mu + \nu = n > m + 1 = \bar{m}) \quad (8^*)$$

В целях дальнейшего упрощения записи свода (8), (8*) введем в (8*) следующие дополнительные обозначения:

$$\begin{aligned} 1) \begin{pmatrix} a_{(\mu, \bar{m})} \\ b_{(\nu, \bar{m})} \end{pmatrix} &= A_{(\mu + \nu, \bar{m})} = A_{(n\bar{m})}, & 2) \begin{pmatrix} h_{(\mu 1)} \\ f_{(\nu 1)} \end{pmatrix} &= F_{(\mu + \nu, 1)} = F_{(n1)} \\ 3) \begin{pmatrix} \varepsilon_{(\mu 1)} \\ \varepsilon_{(\nu 1)} \end{pmatrix} &= E_{(\mu + \nu, 1)} = E_{(n1)}, & 4) c_{(\bar{m}1)} &= C_{(\bar{m}1)}. \end{aligned} \quad (9)$$

Тогда объединенный свод (8), (8*) из n уравнений ошибок может быть записан в одном из следующих двух видов:

$$\sum_{x=0}^m A_{sx} C_x - F_s = E_s, \quad (s = 1, 2, \dots, n > m + 1 = \bar{m}). \quad (10)$$

$$A_{(n\bar{m})} C_{(\bar{m}1)} - F_{(n1)} = E_{(n1)}, \quad (n > m + 1 = \bar{m}). \quad (10^*)$$

Так как представление (3) для искомой функции $u(x, y)$ является приближенным, m опорных функций $\varphi_x(x, y)$ взаимонезависимы и $n > m$, то существует бесконечное множество совокупностей $c_1^{(v)}, c_2^{(v)}, \dots, c_m^{(v)}$ из m коэффициентов $c_x = C_x$, удовлетворяющих своду уравнений (10) с той или иной степенью точности. Следуя Гауссу, будем считать наиболее надежной такую совокупность c_0, c_1, \dots, c_m коэффициентов $c_x = C_x$, которая удовлетворяет условию способа наименьших квадратов

$$\sum_{s=1}^n E_s^2 = \sum_{s=1}^n E_{s1}^2 = \sum_{s=1}^n E_{1s}^* E_{s1} = E_{(1n)}^* E_{(n1)} = Q^2 = \text{наим.} \quad (11)$$

Но согласно (10)

$$Q^2 = \sum_{s=1}^n E_{1s}^* E_{s1} = Q^2(C_0, C_1, \dots, C_m).$$

Поэтому условие (11) равносильно m условиям

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial C_\lambda} \sum_{s=1}^n E_s^2 &= \frac{\partial}{\partial C_\lambda} Q^2(C_0, C_1, \dots, C_x, \dots, C_m) = 0. \\ (\lambda &= 0, 1, \dots, m) \end{aligned} \quad (12)$$

Выполняя расчет условий (12), найдем последовательно

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial C_\lambda} \sum_{s=1}^n E_s^2 &= 2 \sum_{s=1}^n E_s \frac{\partial E_s}{\partial C_\lambda} = 2 \sum_{s=1}^n E_s \frac{\partial}{\partial C_\lambda} \left(\sum_{x=0}^m A_{sx} C_x - F_s \right) = \\ &= 2 \sum_{s=1}^n E_s \sum_{x=0}^m A_{sx} \frac{\partial C_x}{\partial C_\lambda} = 2 \sum_{s=1}^n E_s \sum_{x=0}^m A_{sx} \delta_x^\lambda = 0, \end{aligned}$$

где

$$\delta_x^\lambda = \begin{cases} +1, & x = \lambda \\ 0, & x \neq \lambda. \end{cases}$$

Отсюда видно, что

$$\sum_{x=0}^m A_{sx} \delta_x^\lambda = A_{s\lambda} = A_{\lambda s}^*.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial C_\lambda} \sum_{s=1}^n E_s^2 &= \sum_{s=1}^n \left(\sum_{x=0}^m A_{sx} C_x - F_s \right) A_{\lambda s}^* = \\ &= \sum_{x=0}^m \left(\sum_{s=1}^n A_{\lambda s}^* A_{sx} \right) C_x - \sum_{s=1}^n A_{\lambda s}^* F_s = 0. \end{aligned} \quad (\lambda=0, 1, \dots, m) \quad (*)$$

Введем обозначения

$$1) \sum_{s=1}^n A_{\lambda s}^* A_{sx} = B_{\lambda x}, \quad 2) \sum_{s=1}^n A_{\lambda s}^* F_s = K_\lambda. \quad (13)$$

или в матричном виде

$$1) A_{(\overline{mn})}^* A_{(n\overline{m})} = B_{(\overline{m}\overline{m})}, \quad 2) A_{(\overline{mn})}^* F_{(n1)} = K_{(\overline{m}1)}. \quad (13^*)$$

Тогда $\overline{m}+1 = m$ условий (12) примут следующий окончательный вид:

$$\sum_{x=0}^m B_{\lambda x} C_x - K_\lambda = 0, \quad (\lambda=0, 1, \dots, m). \quad (14)$$

или в матричном виде

$$B_{(\overline{m}\overline{m})} C_{(\overline{m}1)} - K_{(\overline{m}1)} = 0_{(\overline{m}1)}. \quad (14^*)$$

Решая свод \overline{m} уравнений (14), определим наивыгоднейшие значения $\overline{C}_x = \overline{c}_x$ для m коэффициентов \overline{c}_x , входящих в представление (3) для искомой функции $u(x, y)$. Подстановка же найденных значений этих коэффициентов в уравнения (10) или — что то же — в уравнения (8) даст соответствующие ошибки $\varepsilon_s = \varepsilon_s$, ε_t указанных уравнений.

Правильность расчета коэффициентов $C_x = c_x$, ошибок $\varepsilon_s = \varepsilon_s$, ε_t и величины $Q^2 = \sum_{s=1}^n \varepsilon_s^2$ проверим, умножив уравнение (10*) слева на $A_{(\overline{m}n)}^*$, $\varepsilon_{(1n)}^*$ и $F_{(1n)}^*$. Тогда мы получим следующие поверочные равенства, учитывая (13*) и (14*):

$$\begin{aligned} 1) A_{(\overline{m}n)}^* E_{(n1)} &= 0_{(\overline{m}1)}, \quad 2) Q^2 = E_{(1n)}^* E_{(n1)} = -E_{(1n)}^* F_{(n1)}, \quad (15^*) \\ 3) F_{(1n)}^* F_{(n1)} C_{(\overline{1m})}^* B_{(\overline{m}\overline{m})} C_{(\overline{m}1)} &= E_{(1n)}^* E_{(n1)} = Q^2. \end{aligned}$$

Расчет приближения $\varphi(x, y)$ для искомой функции $u(x, y)$ по описанному выше способу наименьших квадратов позволяет подсчитать также точность этого приближения, задаваемую в виде среднеквадратической ошибки $\pm m_\varphi$ или ее квадрата m_φ^2 . Расчет m_φ^2 производится так [1]:

$$1) \mu^2 = \frac{Q^2}{n-m}; \quad 2) m_{c_x}^2 = \mu^2 \beta_{xx}, (\beta_{\overline{mm}} = B_{\overline{mm}}^{-1}); \quad (16)$$

$$3) m_{\varphi}^2 = m^2 [\varphi(x, y)] = \mu^2 \sum_{x, \lambda=1}^m \beta_{x\lambda} \varphi_x(x, y) \varphi_{\lambda}(x, y) = \\ = \mu^2 \varphi_{\overline{1m}}^*(x, y) \beta_{\overline{mm}} \varphi_{\overline{m1}}(x, y).$$

В заключение отметим, что для построения набора опорных взаимонезависимых функций $\varphi^x(x, y)$ можно взять два ряда

$$x^0 = 1, x^1, x^2, \dots, x^{\mu}, \dots, x^r. \\ y^0 = 1, y^1, y^2, \dots, y^{\nu}, \dots, y^r.$$

и затем образовать матрицу произведения этих видов

$$\begin{matrix} x^0 y^0 & x^1 y^0 & \dots & x^{\mu} y^0 & \dots & x^r y^0 \\ x^0 y^1 & x^1 y^1 & \dots & x^{\mu} y^1 & \dots & x^r y^1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x^0 y^{\nu} & x^1 y^{\nu} & \dots & x^{\mu} y^{\nu} & \dots & x^r y^{\nu} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x^0 y^r & x^1 y^r & \dots & x^{\mu} y^r & \dots & x^r y^r \end{matrix}$$

Тогда

$$\varphi_{\mu\nu}(x, y) = x^{\mu} y^{\nu} = \varphi_x(x, y).$$

Следовательно, в данном случае $m = r^2$.

Для построения набора опорных функций $\varphi_x(x, y)$ можно использовать также ряды

$$T_0^*(x), T_1^*(x), \dots, T_{\mu}^*(x), \dots, T_r^*(x). \\ T_0^*(y), T_1^*(y), \dots, T_{\nu}^*(y), \dots, T_r^*(y),$$

где $T_{\mu}^*(x)$, $T_{\nu}^*(y)$ — приведенные многочлены Чебышева первого рода, определяемые следующим образом [2]:

$$T_0^*(z) = 1, T_1^*(z) = z, T_x^*(z) = \frac{1}{2^{x-1}} \cos(x \arccos z); \\ \arccos z = \theta, z = \cos \theta, T_x^*(\theta) = \frac{1}{2^{x-1}} \cos x\theta; \quad (17) \\ T_{x+1}^*(z) = z T_x^*(z) - \frac{1}{4} T_{x-1}^*(z).$$

Тогда

$$\varphi_{\mu\nu}(x, y) = T_{\mu}^*(x) T_{\nu}^*(y) = \varphi_x(x, y).$$

Чтобы числа $\varphi_{\mu\nu}(x, y)$ не принимали больших значений в области \overline{D}^2 , полезно заключить эту область в квадрат

$$-1 \leq x \leq +1 \\ -1 \leq y \leq +1,$$

взяв центр квадрата O в середине области $\overline{D}^{(2)}$ (рис 1).

Отметим еще, что если число μ точек M_s границы R больше, чем число $m+1$ коэффициентов c_x в представлении (3) для $u(x, y)$ через $\varphi(x, y)$

$$\mu > m + 1,$$

то для определения коэффициентов c_x и расчета квадратичских разбросов $m_{c_x}^2, m_{\varphi}^2$ для найденных c_x и $\varphi(x, y) \approx u(x, y)$ мы могли бы обойтись только точками M_s , взятыми на границе R .

Обобщение. Предлагаемый способ решения краевой задачи для уравнения Пуассона может быть применен так же просто к уравнению Гельмгольца

$$(\Delta + k^2) u(x, y) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k^2 \right) u(x, y) = f(x, y) \quad (17)$$

с граничным условием

$$\left[\alpha(x, y) + \beta(x, y) \frac{\partial}{\partial n} \right] u(x, y) \Big|_r = h(x, y). \quad (18)$$

Более того, изложенный здесь способ позволяет решать совершенно просто даже более трудную краевую задачу для линейного дифференциального уравнения второго порядка с переменными коэффициентами

$$\left[A^{ij}(x, y) \frac{\partial^2}{\partial x^i \partial y^j} + B^i(x, y) \frac{\partial}{\partial x^i} + C \right] u(x, y) = f(x, y). \quad (19)$$

и граничным условием вида (18).

Наконец, совершенно ясно, что предложенным способом решается без всяких осложнений плоская краевая задача для линейного дифференциального уравнения n -го порядка в частных производных и с переменными коэффициентами, если искомая функция u не зависит от времени t , то есть $u = u(x, y)$.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. Иордан. Руководство по геодезии. М., 1939.