

О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ МОНОТОННЫХ ФУНКЦИЙ

Л. Е. ПОРТНОВ

(Представлена проф. П. П. Куфаревым)

Обозначим через $M = \{\varphi(t)\}$ множество всех непрерывных неубывающих функций $\varphi(t)$, определенных на $[0,1]$, таких, что $\varphi(0) = 0$, $\varphi(1) = 1$.

Лемма 1. Пусть последовательность функций

$$\{\varphi_n(t)\} \subset M \tag{1}$$

сходится и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \varphi(t).$$

Если t_0 — точка непрерывности функции $\varphi(t)$, то для любой последовательности $\{t_n\}$, где $t_n \in [0,1]$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t_0$, последовательность $\{\varphi_n(t_n)\}$ (2) сходится и $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t_n) = \varphi(t_0)$.

Последовательность $\{t_n\}$ будем считать строго монотонной, что можно делать, не нарушая общности рассуждений.

Так как $\varphi_n(t) \in M$ и последовательность $\{t_n\}$ монотонна, то справедливо неравенство

$$\begin{aligned} |\varphi_{n+m}(t_{n+m}) - \varphi_{n+m}(t_0)| &\leq |\varphi_{n+m}(t_n) - \varphi_{n+m}(t_0)| \leq |\varphi_{n+m}(t_n) - \varphi(t_n)| + \\ &+ |\varphi_{n+m}(t_0) - \varphi(t_n)| \leq |\varphi_n(t_0) - \varphi(t_n)| + |\varphi_{n+m}(t_0) - \varphi_n(t_0)| + \\ &+ |\varphi_{n+m}(t_n) - \varphi(t_n)| \leq |\varphi_n(t_0) - \varphi(t_0)| + |\varphi(t_n) - \varphi(t_0)| + \\ &+ |\varphi_{n+m}(t_0) - \varphi_n(t_0)| + |\varphi_{n+m}(t_n) - \varphi(t_n)|. \end{aligned} \tag{3}$$

Возьмем $\varepsilon > 0$. Легко видеть, что

$$|\varphi_n(t_0) - \varphi(t_0)| < \frac{\varepsilon}{5} \quad \text{при } n > N_1(\varepsilon, t_0), \tag{4}$$

$$|\varphi_n(t_n) - \varphi(t_0)| < \frac{\varepsilon}{5} \quad \text{при } n > N_2(\varepsilon, t_0),$$

$$|\varphi_{n+m}(t_0) - \varphi_n(t_0)| < \frac{\varepsilon}{5} \quad \text{при } n > N_3(\varepsilon, t_0),$$

$$|\varphi_{n+m}(t_n) - \varphi(t_n)| < \frac{\varepsilon}{5} \quad \text{при } n > N_4(\varepsilon, t_n).$$

Отсюда

$$|\varphi_{n+m}(t_{n+m}) - \varphi_{n+m}(t_0)| < \frac{4}{5} \varepsilon$$

$$\text{при } n + m > N_5 = \max_{i=1,2,3} N_i + N_4. \quad (5)$$

Рассмотрим неравенство

$$|\varphi_n(t_n) - \varphi(t_0)| \leq |\varphi(t_0) - \varphi_n(t_0)| + |\varphi_n(t_n) - \varphi_n(t_0)|.$$

Из (4) и (5) имеем

$$|\varphi(t_0) - \varphi_n(t_0)| < \frac{\varepsilon}{5} \quad \text{при } n > N_3,$$

$$|\varphi_n(t_n) - \varphi_n(t_0)| < \frac{4}{5} \varepsilon \quad \text{при } n > N_5,$$

$$\text{и } |\varphi_n(t_n) - \varphi(t_0)| < \varepsilon \quad \text{при } n > N_5.$$

Лемма 2. Пусть последовательности функций $\{\varphi_n(t)\} \subset M$, $\{\psi_n(t)\} \subset M$ равномерно сходящиеся.

Тогда последовательность функций $\{\varphi_n[\psi_n(t)]\}$ также равномерно сходящаяся.

Доказательство легко следует из неравенства

$$|\varphi[\psi(t)] - \varphi_n[\psi_n(t)]| \leq |\varphi[\psi(t)] - \varphi[\psi_n(t)]| + |\varphi[\psi_n(t)] - \varphi_n[\psi_n(t)]|.$$

Теорема. Пусть $\{\varphi_n(t)\} \subset M$ $n = 1, 2, \dots$ (6) для некоторой последовательности $\{\varphi_m(t)\} \subset \{\varphi_n(t)\}$ можно указать равномерно сходящуюся последовательность функций

$$\{\psi_m(t)\} \subset M \quad (7)$$

такую, что последовательность функций

$$\{\varphi_m[\psi_m(t)]\} \quad (8)$$

будет сходиться равномерно на $[0, 1]$.

Теорему достаточно доказать для случая точечно сходящейся последовательности $\{\varphi_n(t)\}$ к разрывной функции $\psi(t)$. Доказательство будем вести в предположении, что число точек разрыва $\varphi(t)$ бесконечно. В других случаях доказательство упрощается.

Доказательство. Так как функция $\varphi(t)$ монотонна, то точки отрезка $[0, 1]$, в которых она разрывна, можно занумеровать.

Пусть $\varphi(t)$ имеет разрывы в точках $t_1, t_2, \dots, t_i, \dots$ (9)

Положим $\varphi(t_i - 0) = \alpha_1(i)$, $\varphi(t_i + 0) = \alpha_2(i)$, $i = 1, 2, \dots$

Построим для каждой точки t_i последовательности

$$x_1(i), x_2(i), \dots, x_n(i), \dots \quad (10)$$

$$y_1(i), y_2(i), \dots, y_n(i), \dots \quad (11)$$

удовлетворяющие условиям:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n[x_n(i)] = \alpha_1(i), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n[y_n(i)] = \alpha_2(i),$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(i) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(i) = t_i,$$

$$3) \text{ при } i \neq j \quad (x_n^{(i)}, y_n^{(i)}) \cap (x_n^{(j)}, y_n^{(j)}) = \emptyset.$$

Покажем, что такие последовательности (10) и (11) построить можно. Введем в рассмотрение последовательности

$$x_1^0(i), x_2^0(i), \dots, x_n^0(i), \dots \quad (12)$$

$$y_1^0(i), y_2^0(i), \dots, y_n^0(i), \dots \quad (13)$$

где $x_n^0(i)$ таково, что $\varphi_n[x_n^0(i)] = \alpha_1(i)$ и при $t > x_n^0(i)$ $\varphi_n(t) > \alpha_1(i)$; $y_n^0(i)$ такова, что $\varphi_n[y_n^0(i)] = \alpha_2(i)$ и при $t < y_n^0(i)$ $\varphi_n(t) < \alpha_2(i)$.

Пусть $d_i = \alpha_2(i) - \alpha_1(i)$. Так как $\varphi(t_i - 0) = \alpha_1(i)$, то можно указать для каждого натурального числа k точку p_k такую, что

$$|\varphi(p_\kappa) - \alpha_1(i)| < \frac{d_i}{\varrho_{\kappa+1}}, \quad |p_\kappa - t_i| < \frac{1}{\varrho_{\kappa+1}}. \quad (14)$$

Получим последовательность точек $\{p_k\}$.

Ясно, что $\lim_{K \rightarrow \infty} p_K = t_i$.

Для каждой точки $p_\kappa \in \{p_\kappa\}$ и последовательности (6) можно указать номер m_κ такой, что при $n > m_\kappa$

$$|\varphi_n(p_\kappa) - \varphi(p_\kappa)| < \frac{\alpha_l}{2^{\kappa+1}}. \quad (15)$$

Таким образом, последовательности $\{p_k\}$ ставим в соответствие последовательность чисел $\{m_k\}$. При выбранном m_k , m_{k+1} будем выбирать так, чтобы было $m_{k+1} > m_k$.

Теперь построим последовательность $\{x_n(i)\}$

$$x_1(i) = x_1^0(i), \quad x_2(i) = x_2^0(i), \dots, x_m(i) = x_m^0(i)$$

$$\left. \begin{aligned} x_{m_1+2}^{(i)} &= x_{m_1+2}^{(i)} = \dots = x_{m_2}^{(i)} = p_1 \\ x_{m_2+1}^{(i)} &= x_{m_2+2}^{(i)} = \dots = x_{m_3}^{(i)} = p_2 \\ . &. \\ x_{m_\kappa+1}^{(i)} &= x_{m_\kappa+2}^{(i)} = \dots = x_{m_{\kappa+1}}^{(i)} = p_\kappa \\ . &. \end{aligned} \right\}$$

Аналогично строим последовательность $\{y_n(i)\}$. Построенные нами последовательности $\{x_n^{(i)}\}$, $\{y_n^{(i)}\}$ можно считать, соответственно, последовательностями (10) и (11)

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n [x_n(i)] = \alpha_1(i)$, что следует из (10), так как $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(p_k) = x_1(i)$.

Аналогично $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n[y_n(i)] = \alpha_2(i)$.

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(i) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(i) = t_i,$$

3) $x_n^{(i)}, y_n^{(i)} \cap (x_n(j), y_n(j)) = 0$ при $i \neq j$, это следует из того, что $(x_n^0(i), y_n^0(i)) \cap (x_n^0(j), y_n^0(j)) = 0$ при $i \neq j$, а наши последовательности $\{x_n(i)\}, \{y_n(i)\}$ построены таким образом, что $(x_n(i), y_n(i)) \subset (x_n^0(i), y_n^0(i))$, так как из (9) и (10) ясно, что $\varphi_n(x_n(i), y_n(i)) \subset (\alpha_1(i), \alpha_2(i))$.

Построим последовательность функций

$$\{\gamma_n(t)\} \subset M, \quad (16)$$

где

$$\gamma_n(t) = \varphi_n(t) \text{ при } t \in U(x_n(i), y_n(i)), \text{ линейна на } [x_n(i), y_n(i)].$$

Построим последовательности функций

$$\{\hat{G}_n^\kappa(t)\} \quad \kappa = 1, 2, \dots \quad (17)$$

при $\kappa = \kappa_0$, $n = 1, 2, \dots$ следующим образом:

$$\delta'_n(t) = \begin{cases} x_n(1) & \text{при } t = x_1(1), \\ y_n(1) & \text{при } t = y_1(1), \\ \text{линейна на } [0, x_1(1)], [x_1(1), y_1(1)], [y_1(1), 1]. \end{cases}$$

Ясно, что $\delta'(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \delta'_n(t)$ непрерывная на $[0, 1]$ функция, причем на $[0, x_1(1)]$, $[y_1(1), 1]$ $\delta'(t)$ строго монотонна, можно считать, что $0 \neq t_1 \neq 1$ при $t \in [x_1(1), y_1(1)]$, $\delta'(t) = t_1$.

Пусть $\delta'(t) = t_2$ при $t = \tau_2$, $\tau_2 \in \Delta$, где Δ — интервал строгой монотонности функции $\delta'(t)$.

Положим

$$\delta^2(t) = \begin{cases} \delta'(t) & \text{при } t \in (R_1, S_1), \\ t_2 & \text{при } t \in \bar{\delta}_{\tau_2} = [a_1, b_1], \\ \text{причем } \tau_2 \in [a_1, b_1] \subset (R_1, S_1) \text{ и отрезок } [a_1, b_1] \text{ настолько мал,} \\ \text{что } |\delta^1(t) - \delta^2(t)| < \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Построим последовательность функций

$$\{\delta_n^2(t)\} \subset M,$$

так

$$\delta_n^2(t) = \begin{cases} \delta'_n(t) & \text{при } t \in (R_1, S_1), \\ x_n(2) & \text{при } t = a_1, \\ y_n(2) & \text{при } t = b_1 \\ \text{линейна на } [R_1, a_1], [a_1, b_1], [b_1, S_1]. \end{cases}$$

Ясно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n^2(t) = \delta^2(t)$.

Пусть уже построены $\delta^3(t)$ и $\{\delta_n^3(t)\}, \dots, \delta^\kappa(t)$ и $\{\delta_n^\kappa(t)\}$ и пусть $\delta^\kappa(t) = t_{\kappa+1}$ при $t = \tau_{\kappa+1}$, $\tau_{\kappa+2} \in \Delta$, где $\Delta = [R_\kappa, S_\kappa]$ — интервал строгой монотонности функции $\delta^\kappa(t)$.

Положим

$$\delta^{\kappa+1}(t) = \begin{cases} \delta^\kappa(t) & \text{при } t \in [R_\kappa, S_\kappa], \\ t_{\kappa+1} & \text{при } t \in \bar{\delta}_{\tau_{\kappa+1}} = [a_\kappa, b_\kappa], \end{cases}$$

$$\delta^{\kappa+1}(t) = \begin{cases} \delta^\kappa(t) & \text{при } t \in [R_\kappa, S_\kappa], \\ t_{\kappa+1} & \text{при } t \in \bar{\delta}_{\tau_{\kappa+1}} = [a_\kappa, b_\kappa], \\ \text{причем } \tau_{\kappa+1} \in [a_\kappa, b_\kappa] \subset (R_\kappa, S_\kappa) \text{ и отрезок } [a_\kappa, b_\kappa] \text{ на-} \\ \text{столько мал, что } |\delta^\kappa(t) - \delta^{\kappa+1}(t)| < \frac{1}{2^{\kappa+1}}. \end{cases} \quad (18)$$

Построим также последовательность функций

$$\{\delta_n^{\kappa+1}(t)\} \subset M,$$

где

$$\delta_n^{\kappa+1}(t) = \begin{cases} \delta_n^\kappa(t) & \text{при } t \in (R_\kappa, S_\kappa), \\ x_n(\kappa+1) & \text{при } t = a_\kappa, \\ y_n(\kappa+1) & \text{при } t = b_\kappa, \\ \text{линейна на } [R_\kappa, a_\kappa], [a_\kappa, b_\kappa], [b_\kappa, S_\kappa]. \end{cases}$$

Ясно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n^{\kappa+1}(t) = \delta^{\kappa+1}(t)$.

Итак, имеем равномерно сходящиеся последовательности функций

$$\begin{aligned} \delta'_1(t), \dots, \delta'_n(t), \dots \lim \delta'_n = \delta'(t), \\ \dots \dots \dots \end{aligned}$$

$$\begin{matrix} \delta_1^\kappa(t), \dots, \delta_n^\kappa(t), \dots \lim \delta_n^\kappa(t) = \delta^\kappa(t). \\ \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \end{matrix} \quad (19)$$

В силу (18) $\delta(t) = \lim_{\kappa \rightarrow \infty} \delta^\kappa(t)$ непрерывная функция.

$$\begin{aligned} &\text{Рассмотрим функции } \varphi_n(t) \in (1), \gamma_n(t) \in (16) \\ &\varphi_n[x_n(i)] = \gamma_n[x_n(i)], \quad \varphi_n[y_n(i)] = \gamma_n[y_n(i)] \quad (\text{в силу (16)}). \end{aligned} \quad (20)$$

Положим

$$\varepsilon_n(i) = \frac{\gamma_n[y_n(i)] - \gamma_n[x_n(i)]}{2^n}.$$

Произведем разбиение отрезка $[x_n(i), y_n(i)]$ точками $x_n(i) = l_0(i) < l_1(i) < \dots < l_{2^n}(i) = y_n(i)$, чтобы $\varphi_n[x_n(i)] + (p-1)\varepsilon_n(i) \leq \varphi_n(t) \leq \varphi_n[x_n(i)] + p\varepsilon_n(i)$ при $t \in [l_{p-1}^{(i)}, l_p(i)]$, и точками $x_n(i) = S_0(i) < S_1(i) < \dots < S_{2^n}(i) = y_n(i)$, чтобы $\gamma_n[x_n(i)] + (p-1)\varepsilon_n(i) \leq \gamma_n(t) \leq \gamma_n[x_n(i)] + p\varepsilon_n(i)$ $t \in [S_{p-1}(i), S_p(i)]$ $p = 1, 2, \dots, 2^n$.

Положим

$$\begin{aligned} \eta_n^\kappa(t) &= \alpha_n^\kappa(t) + \sum_{i=1}^{\kappa} \sum_{p=1}^{2^n} \beta_p^i(t) \quad \begin{matrix} \kappa = 1, 2, \dots \\ \text{при } \kappa = \kappa_0 \\ n = 1, 2, \dots \end{matrix} \\ \beta_p^i(t) &= \begin{cases} \frac{l_p^{(i)}(t - S_{p-1}^{(i)}) + l_{p-1}^{(i)}(S_p^{(i)} - t)}{S_p^{(i)} - S_{p-1}^{(i)}} & \text{при } t \in [S_{p-1}(i), S_p(i)], \\ 0 & \text{при } t \in [0, 1] \setminus [S_{p-1}(i), S_p(i)] \end{cases} \\ \alpha_n^\kappa(t) &= \begin{cases} t & \text{при } t \in [0, 1] \setminus \bigcup_{i=1}^{\kappa} [x_n(i), y_n(i)], \\ 0 & \text{при } t \in \bigcup_{i=1}^{\kappa} [x_n(i), y_n(i)]. \end{cases} \end{aligned}$$

Легко видеть, что функции последовательности $\{\eta_n^\kappa(t)\}$ (20) таковы, что $\eta_n^\kappa(t) \in M$, $\eta_n^\kappa[x_n(i)] = x_n(i)$, $\eta_n^\kappa[y_n(i)] = y_n(i)$ и при $t \in [x_n(i), y_n(i)]$.

$$|\varphi_n[\eta_n^\kappa(t)] - \gamma_n(t)| \leq \max_i \varepsilon_n(i) \leq \frac{1}{2^n}. \quad (21)$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(i) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(i) = t_i$, то $\eta_n^\kappa(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n^\kappa(t) = t$, т. е. каждая последовательность функций $\{\eta_n^\kappa(t)\}$ $\kappa = 1, 2, \dots$ сходится равномерно на $[0, 1]$ ([1]).

Итак, мы имеем последовательности равномерно сходящихся функций

$$\left. \begin{aligned} &\eta_1'(t), \dots, \eta_n'(t), \dots \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n'(t) = t, \\ &\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ &\eta_1^\kappa(t), \dots, \eta_n^\kappa(t), \dots \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n^\kappa(t) = t. \\ &\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \end{aligned} \right\} \quad (22)$$

Пусть $\{\kappa_m\} \cdot m = 1, 2, \dots$ последовательность чисел натурального ряда такая, что при $i > \kappa_m$

$$d_i = \alpha_2(i) - \alpha_1(i) < \frac{1}{2^m}. \quad (23)$$

Такая последовательность существует, так как $\sum_i d_i \leq 1$. Пусть далее $\{n_m\}$ последовательность натуральных чисел такая, что

$$|\gamma_{n_m}^{\kappa m}(t) - t| < \frac{1}{2^m}, \quad |\delta_{n_m}^{\kappa m}(t) - \delta^{\kappa m}(t)| < \frac{1}{2^m},$$

причем последовательность $\{n_m\}$ строим так, чтобы было $n_m < m$. Такую последовательность чисел $\{n_m\}$ можно выбрать, так как последовательности (19) и (22) сходятся равномерно. Отсюда, учтя (16), (20), (21), (23) и то, что $n_m > m$, имеем

$$|\varphi_{n_m}[\gamma_{n_m}^{\kappa m}(t)] - \gamma_{n_m}(t)| < \frac{1}{2^m}, \quad (24)$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_{n_m}^{\kappa m}(t) = t, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \delta_{n_m}^{\kappa m}(t) = \lim_{m \rightarrow \infty} \delta^{\kappa m}(t) = \delta(t).$$

Для простоты обозначим

$$\begin{aligned} \{\varphi_{n_m}(t)\} &= \{\varphi_m(t)\}, & \{\gamma_{n_m}(t)\} &= \{\gamma_m(t)\}, \\ \{\gamma_{n_m}^{\kappa m}(t)\} &= \{\gamma_m(t)\}, & \{\delta_{n_m}^{\kappa m}(t)\} &= \{\delta_m(t)\}. \end{aligned}$$

Неравенство (24) запишется так:

$$|\varphi_m[\gamma_m(t)] - \gamma_m(t)| < \frac{1}{2^m}. \quad (24')$$

Пусть $\psi_m(t) = \gamma_m[\delta_m(t)]$. По лемме (2) последовательность функций $\{\psi_m(t)\}$ (25) сходится равномерно.

Теперь для доказательства теоремы достаточно показать, что последовательность функций $\{\gamma_m[\delta_m(t)]\}$ (26) сходится равномерно.

В самом деле, пусть $\varepsilon > 0$ произвольно.

$$\begin{aligned} |\varphi_m[\psi_m(t)] - \varphi_{m+n}[\psi_{m+n}(t)]| &= |\varphi_m\{\gamma_m[\delta_m(t)]\} - \varphi_{m+n}\{\gamma_{m+n}[\delta_{m+n}(t)]\}| \leq \\ &\leq |\varphi_m\{\gamma_m[\delta_m(t)]\} - \gamma_m[\delta_m(t)]| + |\varphi_{m+n}\{\gamma_{m+n}[\delta_{m+n}(t)]\} - \gamma_{m+n}[\delta_{m+n}(t)]| + \\ &+ |\gamma_m[\delta_m(t)] - \gamma_{m+n}[\delta_{m+n}(t)]|. \end{aligned} \quad (27)$$

Из полученного неравенства (27) с учетом (24') следует, что последовательность функций $\{\varphi_m[\psi_m(t)]\}$ (28) сходится равномерно на отрезке $[0, 1]$, если равномерно сходится последовательность функций (26).

Покажем, что последовательность функций (21) сходится равномерно. Для этого достаточно показать, учитывая [1], что $\xi(t) = \lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_m[\delta_m(t)]$ непрерывная на $[0, 1]$ функция.

При $t \in [a_i, b_i]$

$$\gamma_m[\delta_m(t)] = \frac{\gamma_m[y_m(i)] - \gamma_m[x_m(i)]}{b_i - a_i} (t - b_i) + \gamma_m[y_m(i)].$$

Но так как $\lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_m[x_m(i)] = \alpha_1(i)$, $\lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_m[y_m(i)] = \alpha_2(i)$, то

$$\xi(t) = \frac{\alpha_2(i) - \alpha_1(i)}{b_i - a_i} (t - b_i) + \alpha_2(i) \quad t \in [a_i, b_i].$$

Пусть $E = [0, 1] \setminus \bigcup_i t_i$, где t_i — точка разрыва функции $\varphi(t)$. На E функция $\varphi(t)$ непрерывна. Покажем, что $\xi(t) = \varphi[\delta(t)]$ при $t \in \delta^{-1}(E)$,

тогда так как $\delta(t)$ непрерывна на $[0, 1]$, а $\varphi(t)$ непрерывна на E , то функция $\xi(t) = \varphi[\delta(t)]$ непрерывна на $\delta^{-1}(E) = [0, 1] \setminus \bigcup_i [a_i, b_i]$.

Пусть $t_0 \in \delta^{-1}(E)$, тогда $\delta(t_0) \in E$, т. е. $\delta(t_0)$ — точка непрерывности функции $\varphi(t)$.

Так как $\lim_{m \rightarrow \infty} \delta_m(t_0) = \delta(t_0)$, то по лемме 1

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_m[\delta_m(t_0)] = \lim_{m \rightarrow \infty} \varphi_m[\delta_m(t_0)] = \varphi[\delta(t_0)].$$

При $t \in ([0, 1] \setminus \bigcup_i [a_i, b_i])$ $\gamma_m[\delta_m(t)] = \varphi_m[\delta_m(t)]$ в силу (13) и (16).

Теперь нетрудно видеть, что $\xi(t) = \lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_m[\delta_m(t)]$ есть функция непрерывная во всех точках $[0, 1]$, так как

$$\xi(t) = \begin{cases} \varphi[\delta(t)] & \text{при } t \in \delta^{-1}(E) = [0, 1] \setminus \bigcup_i [a_i, b_i], \\ \frac{\alpha_2(i) - \alpha_1(i)}{b_i - a_i} (t - b_i) + \alpha_2(i) & \text{при } t \in [a_i, b_i] \end{cases}$$

и если $t_\kappa \in \delta^{-1}(E)$, тогда при $t_\kappa \rightarrow a_i \lim_{\kappa \rightarrow \infty} \varphi[\delta(t_\kappa)] = \alpha_1(i)$, так как $\delta(t_\kappa) \rightarrow (t_i - 0)$, а при $t_\kappa \rightarrow b_i \lim_{\kappa \rightarrow \infty} \varphi[\delta(t_\kappa)] = \alpha_2(i)$, так как $\delta(t_\kappa) \rightarrow (t_i + 0)$.

Если же $\{t_\kappa\} \in [0, 1] \setminus \delta^{-1}(E)$, то при $t_\kappa \rightarrow a_i \lim_{\kappa \rightarrow \infty} \xi(t_\kappa) = \alpha_1(i)$ при $t_\kappa \rightarrow b_i \lim_{\kappa \rightarrow \infty} \xi(t_\kappa) = \alpha_2(i)$, т. е. $\xi(t)$ непрерывна в точках a_i, b_i .

ЛИТЕРАТУРА

1. Поляна и Г. Сеге. Задачи и теоремы из анализа. Гос. изд. технико-теоретической литературы, М., т. 1, отдел 11, № 127, 1956.