

ИЗВѢСТИЯ  
Томского Технологического Института  
Императора Николая II.  
т. 12. 1908. № 4.

I.

**С. Ю. Доборжинский.**

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ЮЖНО-РУССКОГО МАРГАНЦЕВАГО МѢСТОРОЖДЕНИЯ

*Съ приложением таблицы чертежей и карты.*

1—19.

Благодаря историческимъ событиямъ послѣдняго времени, главный поставщикъ на всемирные рынки марганцевой руды, Кавказъ, сильно сократилъ свою производительность. Одновременно спросъ на этотъ материалъ, благодаря тому, что онъ все болѣе и болѣе находитъ примѣненіе въ металлургіи, не только не уменьшился, но наоборотъ сильно увеличился. Обстоятельства эти заставили горнопромышленниковъ обратить болѣе вниманія на южно-русское марганцевое мѣсторожденіе въ окрестностяхъ города Никополя на Днѣпрѣ, въ которомъ добыча марганцевыхъ рудъ, въ настоящее время, относительно не велика сравнительно съ ихъ запасомъ.

Мною лѣтомъ и осенью 1906 г. производилась развѣдка въ окрестностяхъ села Городище, по порученію Днѣпровскаго Общества; полученные данныя я здѣсь и излагаю. Въ техническомъ отношеніи эти развѣдки не представляютъ ничего особеннаго; поэтому я коснусь этой стороны только вскользь, обративъ болѣе вниманія на условія залеганія руды и ея свойства.

Прекрасная монографія марганцеваго мѣсторожденія этого края, составленная Соколовымъ, даетъ мнѣ возможность ограничиться лишь только новыми фактами, добтыми развѣдками, и новыми возврѣніями, явившимися какъ слѣдствіе расширенія нашего кругозора въ интересующей насть области.

Такъ какъ Соколовымъ изучалась главнымъ образомъ западная часть мѣсторожденія, Покровская экономія и прочее, мною же развѣдывались окрестности села Городище, то эти новыя работы являются естественнымъ пополненіемъ фактическаго материала, опубликованного Соколовымъ.

---

## **Геологический очеркъ села Городище и окрестностей.**

Въ орографическомъ отношеніи интересующая нась мѣстность представляется неровной, волнистой. Рельефъ ея поверхности сходень вообще съ другими частями побережья Днѣпра въ степной части его теченія. Волнистость мѣстности обусловлена системой овраговъ и сухихъ рѣчекъ, такъ называемыхъ балокъ, по склонамъ которыхъ можно наблюдать прекрасныя естественныя обнаженія породъ, входящихъ въ составъ поверхности земли. Совокупность естественныхъ обнаженій, горныхъ работъ по добычѣ марганцевой руды и развѣдокъ даетъ намъ возможность составить себѣ вполнѣ ясное представление о геологическомъ строеніи данной мѣстности.

Основаніемъ всѣхъ осадочныхъ породъ здѣсь является гнейсо-гранитъ, выходы котораго можно наблюдать по берегамъ русла рѣчки Томаковки, въ р. Большой и Малой Каменкѣ. Гранитъ же обнаруженъ въ цѣломъ рядѣ шурfovъ, проведенныхъ горн. инж. Войновичемъ по сѣверной сторонѣ теперешняго рудника между Томаковкой и Б. Каменкой. Порода эта состоитъ главнымъ образомъ изъ кварца портоклаза съ малымъ количествомъ слюды, которая подчасъ совсѣмъ отсутствуетъ. Иногда наслоеній не замѣтно, и тогда описываемую нами породу надо считать гранитомъ; иногда же слоеватость является вполнѣ ясно выраженной, и тогда ее надо назвать гнейсомъ. Кромѣ слоеватости есть еще отдѣльность, обусловливаемая цѣлымъ рядомъ системъ трещинъ вертикальныхъ и горизонтальныхъ. Преобладающее направленіе трещинъ NW  $350^{\circ}$  и  $310^{\circ}$ , NO  $55^{\circ}$ — $60^{\circ}$ ; есть NO  $20^{\circ}$ — $70^{\circ}$ , а также  $140^{\circ}$ — $150^{\circ}$ . Кромѣ того въ гнейсахъ попадаются жилы крупнозернистаго гранита и темносѣраго сиенита. Между рѣчками Б. Каменкой и Томаковкой надо предполагать существованіе гранитной гряды, вдоль которой текутъ названныя рѣчки. Въ балкахъ, впадающихъ въ эти рѣчки, а также по берегамъ ихъ, гранитъ покрывается непосредственно диллювиемъ: лессомъ и буро-красными глинами; въ шурфахъ, по сѣверной сторонѣ рудника встрѣчается однако уже зеленая олигоце новая глина. Въ южномъ направленіи разрѣзъ становится вполнѣ вполнѣ до широкихъ рѣчныхъ долинъ Томаковки, Ревуна и Рѣчища,

въ которыхъ на гранитахъ лежать непосредственно новѣйшіе наносы, состоящіе главнѣйшимъ образомъ изъ кварцеваго песку различной круности съ примѣсью зеренъ и галекъ полевого шпата и изрѣдка пиролюзита, а также изъ прослойковъ рѣчного ила.

На южной, пониженнай части вышеописанной гряды, расположень Городищенскій рудникъ, на юго-восточномъ склонѣ,—Николаевскій, а на юго-западномъ штейгеромъ Бонковскимъ заложено нѣсколько буровыхъ скважинъ, обнаружившихъ марганцевую руду. Условія залеганія марганцевой руды въ Городищенскомъ рудникѣ слѣдующія: на крайне неровной, волнистой, зазубренной поверхности гранито-гнейсовъ лежать продукты разложенія ихъ же: песокъ, состоящій изъ угловатыхъ кварцевыхъ зеренъ, каолинъ бѣлый или розовый или иногда сѣрий отъ мельчайшихъ частичекъ пиролюзита и зеленая песчанистая глина. Въ этихъ отложеніяхъ отчасти сглаживающихъ неровности гранитной подошвы находятся въ изобилии остатки морской фауны, на основаніи которой возрастъ этихъ отложенийъ относять къ третичному—олигоценовому ярусу.

Слой марганцевой руды, крайне неровный главнымъ образомъ вслѣдствіе неровности гранита, но есть и слѣды размыва: напр. верхняя часть отсутствуетъ, такъ что кровельная зеленая глина лежить непосредственно на нижней части его; это старый размывъ. Вблизи овраговъ наблюдается иногда залеганіе на марганцѣ непосредственно бурыхъ глинъ или лесса, это результатъ размыва въ послѣ-третичной эпохѣ, до отложенія диллювиальныхъ осадковъ. Мнѣ известны также случаи непосредственного залеганія современныхъ отложенийъ на марганцевой рудѣ.

Нижняя часть рудоноснаго пласта состоитъ изъ небольшихъ орѣхоподобныхъ стяженій пиролюзита до дюйма въ диаметрѣ; толщина этого слоя среднимъ числомъ около 0,4 мет. Это самая высокая по процентному содержанію марганца часть пласта. Выше лежить черная (отъ примѣси пиролюзита) песчанистая глина, въ которой находятся два—три прослойка зернистой руды, и кромѣ того въ ней неравномерно расбросаны зерна пиролюзита\*). Слой зернистой руды иногда находится по серединѣ пласта. Полная мощность пласта до 2,8 мет.

Распространеніе нынѣ разработываемой части пласта съ южной стороны ограничивается долиной рѣки Томаковки, въ которой онъ размытъ, и появляется опять по той сторонѣ названной долины на земляхъ Невелиной и Трубчининовыхъ, где онъ былъ обнаруженъ при помощи нѣсколькихъ шурfovъ и буровыхъ скважинъ и отчасти даже разработывался.

\*.) Ср. Соколовъ.

Естественные обнажения въ балкѣ Отчепатевкѣ и въ оврагахъ, впадающихъ въ долину Томаковки, по близости казенной лѣсной дачи Ракшиной, въ общемъ сходны съ описываемымъ Соколовымъ въ балкахъ имѣнія Мысъ Доброй Надежды и Грушевкѣ.

Нижнія части сарматского яруса и пластъ марганцевой руды въ этихъ балкахъ не обнажаются и находятся ниже уровня Даѣпира.

Известняки pontijskаго яруса обнажаются также на островѣ Городище, бывшей казацкой станицѣ, отъ которой название получило нынѣшнее село; такие же известняки имѣются въ каменоломнѣ на границѣ съ землями Красногригорьевки, вблизи которой заложены были скважины Бонковскаго. Повидимому pontijskie известняки распространены почти по цѣлой изслѣдуемой площади въ болѣе возвышенныхъ ея частяхъ; они, а также цѣлый сарматскій ярусъ лежать нѣсколько несогласно съ пластомъ марганцевыхъ рудъ и поверхностью гранитовъ, которые имѣютъ нѣкоторый уклонъ къ югу, верхніе же слои или вполнѣ горизонтальны, или подчасть нѣсколько наклонены къ сѣверу.

### Общий планъ разведокъ.

Такъ какъ требовалось узнать въ самое непродолжительное время пространство, занимаемое марганцевою залежью, и ея среднюю толщину, то, несмотря на невполнѣ выясненный характеръ залеганія этихъ рудъ, рѣшено было бурить скважины въ довольно большихъ разстояніяхъ одна отъ другой, а именно по 400 мет. по линіямъ общаго простиранія EW и при томъ такъ, чтобы скважины приходились въ шахматномъ порядке. Такъ какъ сѣверная межа имѣнія Трубчаниновыхъ приблизительно совпадаетъ съ этимъ направленіемъ, то не дожидалась окончательной съемки плановъ и разбивки было приступлено къ работѣ на этой межѣ, а затѣмъ по мѣрѣ увеличенія количества буровыхъ инструментовъ и по другимъ линіямъ, параллельнымъ этой межѣ, въ разстояніи 400 метр. одна отъ другой. Скважины проводились согласно заданному положенію, не смущаясь различіемъ показаній двухъ соседнихъ, а то на основаніи извѣстной непостоянности пласта марганца, какъ въ отношеніи мощности, такъ и другихъ свойствъ. Въ случаѣ крупнаго разногласія въ опредѣленіяхъ получаемыхъ двумя соседними скважинами имѣлось въ виду бурить между ними промежуточныя; однако на самомъ дѣлѣ почти не приходилось прибѣгать къ этому средству.

Для того чтобы получить возможность сравнивать качество руды въ скважинахъ, добытыя пробы подвергались анализу: опредѣлялось

количество зерна  $>2'$  тт. и  $<2$  тт. и процентное содержание марганца и кремнезема. Хотя этимъ путемъ и нельзя узнать фактической пригодности или непригодности руды для добычи, но тѣмъ не менѣе данная анализа въ совокупности съ другими, то-есть характеромъ рудныхъ зеренъ, толщиною пласта, его строенiemъ, простиранiemъ и паденiemъ, со свойствами покрывающихъ его породъ наконецъ, позволяютъ дѣлать нѣкоторыя заключенія о свойствахъ, однообразны или разнообразны руды въ данномъ участкѣ. Изъ развѣданнаго буровыми скважинами пространства выдѣлялись участки въ 600000—800000 M<sup>2</sup> на протяженіи которыхъ пластъ оказался по своей мощности годнымъ для разработки, а руда въ общемъ однообразной, и по серединѣ ихъ закладывался шурфъ или шахта, смотря по глубинѣ и устойчивости породъ. Въ случаѣ неглубокаго залеганія закладывались шурфы 1 м.  $\times$  2 м., въ случаѣ же необходимости пройти 20—40 мет. глубины, въ особенности, если имѣются плытуны, шахты 2,10 м.  $\times$  2,30 м., болѣе основательныя по размѣрамъ и по способу крѣпленія, и потому болѣе обеспечивающія успѣшность проходки.

Осмотръ разрѣза пласта въ штрекахъ, проходимыхъ изъ шахты, химическій анализъ руды по пробамъ, взятымъ съ различныхъ точекъ пласта и штрека, а главнымъ образомъ валовая прoba добытой руды на промывочной фабрикѣ, служила материаломъ для окончательного опредѣленія пригодности или непригодности данного участка для разработки.

### **Производство разведочныхъ работъ.**

Одновременно работало 8 буровыхъ вышекъ, буреніе ручное вращательное главнымъ образомъ при помощи змѣевика и ложки. Болѣе твердые породы (известняки) проходились при помощи ударнаго буренія съ раздвижныхъ ножницъ. Работа затруднялась нѣсколько воронконосными песками, плытунами, изъ которыхъ нижній, лежащий непосредственно на зеленыхъ глинахъ, покрывающихъ марганецъ, являлся мѣстами довольно злокачественнымъ и требовалъ крѣпленія обсадными трубами. Верхніе пески замазывались глиной во время дальнѣйшей работы и переставали запыливать сами собой.

Работа въ верхнихъ горизонтахъ шла очень хорошо: пробуривали 3—4 и до 6 саженей въ смѣну; въ вязкихъ глинахъ сарматскаго яруса она становилась менѣе успѣшной. Съ нижнимъ плытуномъ приходилось вообще повозиться нѣсколько дней, такъ что для мелкихъ скважинъ отъ 20 до 30 мет. надо считать 4 мет. въ смѣну, для болѣе же глубокихъ 2 мет. и менѣе, смотря по обстоятельствамъ.

При всякомъ подъемѣ штангъ бралась пробы пробуренной породы и складывалась въ особомъ ящикѣ съ перегородками. Толщина и название этихъ породъ записывались въ книжкѣ у старшаго рабочаго скважины имъ самимъ или же, въ случаѣ его неграмотности, десятникомъ. Ежедневно глубина скважинъ провѣрялась штейгеромъ и вносились, равно какъ и наименование породъ, въ черновой журналъ буровыхъ работъ, веденныи штейгеромъ. При пробуриваніи марганцеваго пласта обязательно присутствовалъ штейгеръ или десятникъ. Послѣ окончанія скважины записи, провѣренныя и сличенные съ обращиками породъ, вносились въ общий буровой журналъ, въ которомъ возвѣ же отмѣчались результаты анализа и ручной промывки руды изъ скважинъ.

Линіи буровыхъ работъ пронивелированы по скважинамъ, изъ которыхъ каждая въ журналѣ и на планѣ обозначена № по порядку заложенія. Новыхъ шахтъ и шурfovъ пройдено 5; кромѣ того для выводовъ мы пользовались готовыми шахтами въ имѣніяхъ Шишкіныхъ и Невелиной.

Крѣпъ въ шурфахъ сверху, въ лессѣ и глинахъ шторцевая, съ разшивкой досками, въ пескахъ срубовая. Шахты крѣпились сплошной срубовой крѣпью. Проходка шла довольно медленно, въ особенности въ глинахъ сарматскаго яруса.

До глубины 16 мет. примѣнялся подъемъ на ручномъ воротѣ, затѣмъ же ставились конные вороты по два, одинъ для подъема руды, второй для водоотлива.

Журналъ проходки шахтъ велся по общему вышеописанному способу.

### **Имѣніе Трубчаниновыхъ.**

Первая буровая скважина (№ 1) была заложена на сѣверной межѣ этого имѣнія, которую мы будемъ считать первой разрѣдочной линіей. Скважина прошла лессъ, рѣчной песокъ, зеленую глину и была остановлена въ угловатомъ кварцевомъ гравіи съ глиной и небольшимъ количествомъ кусковъ полевого шпата, а также комковъ известковаго вещества. Скважина № 2 обнаружила тѣ же породы, только слой зеленой, сарматской глины надъ гравіемъ былъ немного толще. Точно такіе же результаты были получены скважинами № 3 и 4; тогда решено было повернуть на западъ; въ скважинѣ № 5 послѣ проходки тѣхъ же породъ оказалось 0,60 мет. марганца, сосѣдняя скважина № 6 прошла уже полный пластъ марганцевой руды, подъ которымъ находится песокъ, очень похожій на описанный выше при № 1, съ белымъ каолиномъ. Скважина № 7 показала 0,80 мар. руды, непо-

средственно подъ рѣчнымъ наносомъ, въ которомъ изрѣдка попадались окатанныя гальки пиролюзита; зеленая глина здѣсь отсутствуетъ. Скважина № 8 все время шла въ рѣчныхъ пескахъ, перепластовываемыхъ тонкими слоями ила; попадались гальки пиролюзита. Очевидно, на западной сторонѣ мы имѣемъ дѣло съ рѣчнымъ размывомъ, который смылъ всѣ третичные отложения и пластъ марганца въ томъ числѣ; слѣды его остались въ рѣчныхъ отложенияхъ въ видѣ галекъ.

Съ восточной же стороны къ скважинамъ № 1, 2, 3, 4 подходитъ повидимому часть той гранитной гряды, о которой мы говорили раньше; здѣсь мы имѣемъ, вѣроятно, дѣло съ отмелю, которая въ видѣ длинной узкой полосы врѣзывалась въ олигоценовское море; угловатый гравій, комки известняка не что иное, какъ набережныя отложения этого моря.

Схематический разрѣзъ этой части имѣнія по развѣдочной линіи можно представить такъ какъ показано на чертежѣ № 1.

Описанными работами намѣтился дальниѣшій ходъ развѣдокъ: слѣдовало съ одной стороны выяснить предѣлъ размыва рѣки Томаковки, съ другой же протяженіе гранитной гряды отмели, которой ограничивается распространеніе марганцевой залежи отъ востока. Первое дается конечными западными скважинами, второе восточными, граница распространенія марганцевой залежи обозначена на приложенномъ планѣ. Что касается мощности пласта залежи тоже является довольно разнообразной, хотя замѣчается нѣкоторое общее уменьшеніе ея къ югу. На планѣ при всякой скважинѣ помѣчена толщина пласта пройденной руды.

Направленіе простиранія и паденія пласта вообще крайне разнообразно. При болѣе внимательномъ рассматриваніи этихъ направленій уясняется, однако, цѣлый рядъ частныхъ мульдообразныхъ углубленій и сѣдловидныхъ возвышений. По линіи старой Трубчаниновской шахты второй № 5 и 15 бур. скваж. существуетъ какая то неправильность строенія, что усматривается по даннымъ указанныхъ буровыхъ скважинъ, и кромѣ того западнымъ развѣдочнымъ штрекомъ изъ шахты № 1 былъ встрѣченъ гранитъ и руда пошла въ подъемъ. Величина угла паденія колеблется между 0 и 10° при всевозможныхъ направленіяхъ этого паденія, какъ было указано.

Въ минералогическомъ отношеніи, судя по обломкамъ зеренъ, получаемымъ отъ промывки буровыхъ пробъ, свойства руды мѣняются по направлению съ сѣвера на югъ, а именно зерна ея становятся тверже, болѣе угловатыми, по цвету она болѣе бурая. Слѣдуетъ предполагать, что измѣненіе физическихъ свойствъ связано съ химическимъ составомъ, и является вопросъ, имѣемъ ли мы здѣсь дѣло съ пиролю-

зитомъ? Не является ли данная руда иѣкоторой смѣсью, переходомъ къ брауниту? Само собою, что наблюдаемое явленіе въ самомъ отчетливомъ видѣ должно обрисовываться на отводѣ Шишкиныхъ; это мы видимъ на самомъ дѣлѣ и поэтому вернемся еще къ этому предмету.

Въ сѣверной части имѣнія Трубчаниновыхъ руда въ общемъ не отличается отъ добываемой на Городищенскомъ рудникѣ. Южная часть за шахтой № 1 служить переходнымъ звеномъ къ типу руды Шишкиныхъ. Шурфъ № 0 и шахта 1-я, заложенные для опредѣленія достоинства руды при помощи пробъ на промывочной фабрикѣ, подтвердили сдѣланное на основаніи буровыхъ пробъ предположеніе о сходствѣ руды въ сѣверо-западной части имѣнія Трубчаниновыхъ съ рудой Городищенского рудника. Она оказалась вполнѣ доброкачественной. Пласти состоять главнымъ образомъ изъ зернистой руды съ нѣсколькими короткими, не пріуроченными къ опредѣленнымъ горизонтамъ пропластками глины сѣрой. Выше находится такъ называемая присуха, это мелкая руда, вкрапленная въ тонкій 0,2 мет. пластикѣ известняка. Толщина полнаго пласта въ шурфѣ и штрекахъ, произведенныхъ изъ него, то есть зернистая руда съ сажей, около 2,70 м., въ шахтѣ № 1-ый 2,00 м. Все пространство, занятое пластомъ въ западной части имѣнія Трубчаниновыхъ, заключаетъ круглымъ числомъ 1250000 кв. метр., если отъ этой цифры отнять 150000 кв. мет. тѣхъ частей, въ которыхъ, повидимому, пласти являются, по причинѣ своей малой мощности, негоднымъ для разработки. На остальномъ пространствѣ средняя мощность его 2,20 мет.; итакъ запасъ его въ куб. метрахъ опредѣляется приблизительно цифрою 2400000 к. м.

Въ восточной части имѣнія поисковой скважиной № 29 найдено 1,20 мет. марганцевой руды; по добытой пробѣ нельзя даже приблизительно опредѣлить характера руды, а тѣмъ болѣе ея пригодности или непригодности для разработки. Въ пробѣ находится большое количество песку; явленіе это объясняется тѣмъ, что мокрый песокъ, лежащий выше зеленыхъ глинъ, будучи незакрѣпленъ трубами, свободно проникалъ до руды и смѣшивался съ нею при буреніи. Въ обломкахъ зеренъ руды кусочковъ кварца не замѣчалось, такъ что вопросъ будетъ ли эта руда походить на руду съ сосѣдняго Николаевскаго рудника или нѣтъ, остается пока открытымъ. Значительное количество песку въ пробѣ указываетъ на сходство съ Николаевской, которая именно благодаря большому содержанію кварца была признана негодной и въ настоящее время не добывается; но съ другой стороны песчанистость Николаевской руды тѣсно связана строеніемъ самыхъ зеренъ ея, которые являются чѣмъ то похожими на комки крупнозернистаго песчаника, сцементированаго марганцевистымъ веществомъ;

даже мелкие обломки зеренъ этой руды не лишены кварцевыхъ включений, которыхъ нѣтъ въ рудѣ съ № 29.

Найденная нами залежь—пластъ лежить несомнѣнно на восточномъ склонѣ гранитной гряды, западная граница которой по отношенію къ марганцевому пласту прослѣжена почти на всемъ протяженіи Городищенского, Трубчаниновскаго и Шишкинского рудника, и будущія развѣдки ея въ этой части слѣдуетъ вести по направленію къ востоку и къ югу.

По всей вѣроятности скважина № 29, судя по толщинѣ пласта руды, пройденного ею, попала на западный край его, такъ что граница гранитовъ должна прилегать невдалекъ отъ нея. Такъ какъ граница эта въ общихъ чертахъ и приблизительно должна быть параллельна оси гранитной гряды (NS) при некоторомъ стклененіи къ западу, обусловливаемымъ постепеннымъ съуженіемъ гряды, то можно предполагать, что восточный уголъ имѣнія Трубчаниновыхъ окажется рудоноснымъ.

### **Имѣніе Шишкиныхъ.**

Развѣдочными работами обнаружено, что вся восточная часть имѣнія занята гранитами, граница которыхъ обозначена на картѣ. Выходы на дневную поверхность гранитной гряды найдены у рѣки Рѣчица, такъ что направленіе оси гряды въ настоящее время можно указать довольно точно: на протяженіи имѣній Трубчаниновыхъ и Шишкиныхъ ось гряды имѣеть направленіе N S и проходить вблизи восточной межи Шишкиныхъ, такъ что отсутствіе марганцевой руды въ этой части имѣнія является почти несомнѣннымъ. Выводъ этотъ, основанный на общихъ данныхъ подтверждается: 1) развѣдочными скважинами г. Миклашевскаго, пробуренными до нынѣшихъ развѣдокъ, 2) фактамъ находки марганцевой руды гораздо болѣе на востокѣ въ имѣніяхъ Илиныхъ и Шпонки, прилегающихъ къ восточной межѣ Шишкиныхъ. Скважинѣ № 29, обнаружившая руду у Трубчаниновыхъ лежитъ тоже гораздо восточнѣе. По собраннымъ мною свѣдѣніямъ, руда у Илиныхъ и Шпонки ограничивается съ запада гранитами, которые по всей вѣроятности не что иное, какъ восточный склонъ гряды, съ которой намъ приходится имѣть дѣло.

Итакъ рудоносной является только западная часть имѣнія, составляющая непосредственное продолженіе пласта Городища и Трубчаниновыхъ. Съверной границей этого участка служить межа Трубчаниновыхъ, западной—размытъ рѣки Томаковки, съ юго-запада прилегаютъ рудоносныя же земли деревни Маріевки, развѣданныя г. Беклемишевымъ. Южную границу составляетъ размытъ Днѣпра, обозна-

ченный на приложенной карте. Граница размыва реки Томаковки определена вполне точно, по рельефу местности и буро-ым скважинам; размытый Днепра пришлось обозначать, руководствуясь рельефом, направлением течения рукава Речица и конечными южными скважинами Миклашевского. Впрочем вполне точное определение южной границы залежи не имет практического значения для выяснения величины поля, пригодного для разработки.

Схематически разрез южной части участка, о котором идет речь, может быть представлено черт. № 2.

Итак между вертикальными линиями АА' и ВВ' верхнетретичные отложения являются смытыми, место их заняли новые речные образования, пески и гравий, пропитанные, понятно, водой. Виду этого участка пласти, в участке ограниченном линией АА', которой на плане соответствует синяя линия, и ВВ' — на плане пунктирная синяя, лежит или непосредственно под плавунами, или же отделена от них небольшой мощности пропластком глин, уцелевших от размыва; а следовательно участок этот является совсем непригодным для разработки, по причине технических затруднений при проходке плавунов шахтами и возможности проникания их в выработки при обвалах. Считаю нужным обратить внимание на то обстоятельство, что пески, лежащие выше зеленых глин покрывающих марганец являются в южной части имени Шишкиных вездь водоносными, так что вообще надо иметь виду проходку по крайней мере одного плавуна.

Итак, с практической точки зрения является более нужным определить точно не границу размыва, а границу верхних плавунов, которые занимают все древне-днепровское русло, обрисовывающееся на поверхности террасами. В описываемой мною местности террасы I-ая и II-ая сливаются почти незаметно в одну слегка только покатую равнину, вполне явственна только третья терраса III, у подножия которой кончаются речные отложения и плавуны. В этом месте нами проходила шахта № V, оставленная в виду злокачественности плавуна, встреченного в нижней части желтых лессовидных глин, и буровые скважины № 48, 49, 51, из которых в первых двух плавуна не оказалось. Сообразуясь с данными этих разведочных работ и рельефом местности, который сам по себе дает возможность довольно точно установить очертания древнего русла, мною назначена граница плавунов (предполагаемая) пунктирной синей линией, проходящая севернее № V и южнее 48 и 49.

В долине реки Томаковки наблюдается то же самое явление, хотя и не в таком отчетливом виде, так что граница размыва полного и частного в той части ея течения, которым она омывает съ

запада имѣнія Шишкиныхъ и Трубчаниновыхъ, проходятъ очень близко другъ отъ друга; на сѣверъ отъ межи Трубчаниновыхъ, а равно на югъ отъ теперешняго Городищенскаго рудника линіи эти раздвигаются шире (См. планъ).

Итакъ южную границу полезной площади рудоноснаго участка Шишкиныхъ мы можемъ считать извѣстной съ достаточной точностью.

Съ восточной стороны залежь ограничена гранитной грядой: въ скважинахъ №№ 39, 32, 42 и 43 оказался гранитъ, граница марганцеваго пласта тянется змѣеобразной линіей съ N на S. Такъ какъ у Рѣчица найдены выходы гранитовъ, то можно теоретически и въ этомъ мѣстѣ установить предѣль распространенія пласта марганц. руд. (размытаго) на основаніи нижеслѣдующаго соображенія: Пласти залегаетъ ниже средняго уровня воды въ Днѣпрѣ плюсъ-минусъ на 3 саж. Уклонъ гранитовъ приблизительно 12 : 1000, согласно развѣдоочнымъ даннымъ. Итакъ граниты на уровнѣ, соответствующемъ размытому пласту марганца, находятся западнѣе выходовъ на разстояніи 500 метр. (Черт. № 3).

Въ части у берега Рѣчица линія встрѣчи гранитовъ съ марганцемъ показана отчасти сплошной, отчасти пунктирной линіей, въ общемъ параллельно направленію оси гряды. Мощность пласта въ сѣверной и средней части пласта около 1,95 метр., въ южной 1,35 метр. Такъ какъ въ первой заключается около 189000 кв. метр. площади—значить запасъ опредѣлится цифрой 3685000 куб. метр. Южная часть заключаетъ около 500000 кв. метр.—значить запасъ его 675000 куб. метр. Всего 4360000 куб. метр. Для опредѣленія качества руды у насъ имѣлась готовая шахта Миклашевскаго въ балкѣ Отченашевской, изъ которой производилась добыча для валовой пробы. Кромѣ того были пройдены еще № II и III-ій у западной границы, изъ которыхъ добывалась руда для пробъ. Что касается шахтъ № IV и V, помѣщенныхъ на планѣ, то онѣ не были доведены до конца; № IV—за недостаткомъ времени, а № V—по причинѣ трудности проходки плывуновъ. Руда оказалась вполнѣ доброкачественной, по типу она довольно рѣзко отличается отъ Городищенской. Именно—зерна ея гораздо больше, тверже и цвѣта болѣе бураго. По анализу она содержитъ не только Mn O<sub>2</sub> но и Mn<sub>3</sub> O<sub>4</sub>, Mn O, что окончательно осталось не изслѣдованнымъ. Въ отношеніи процентнаго выхода она не уступаетъ Городищенской и Трубчаниновской.

### **Имѣніе Невелиной.**

Наши развѣдоочные работы въ этомъ имѣніи ограничивались определеніемъ юго-восточной границы распространенія марганцевой руды

при помощи скважинъ №№ 35, 36, которые опредѣлили гранитъ. Рудоносная площадь этого имѣнія незначительна вообще, съ сѣвера она ограничивается межой Трубчаниновыхъ, съ юго-запада—размытой долиной р. Томаковки, съ юга—желѣзодорожнымъ отчужденіемъ, а съ юго-востока и востока—гранитной грядой, къ которой призываютъ всѣ здѣшнія залежи руды. Фигура рудоносной площади по виду приблизительно трапеція, она заключаетъ около 42000 кв. мет. О толщинѣ марганцеваго пласта въ этомъ участкѣ мы можемъ судить по скважинамъ, заложеннымъ вдоль сѣверной межи Трубчаниновыхъ, а именно по №№ 6, 38 и 40, которые даютъ въ среднемъ 2,34 мет.; а следовательно здѣсь имѣется круглымъ числомъ 98000 куб. метр. руды. О качествѣ руды давалъ намъ возможность судить штабель-свалъ, имѣвшійся въ этомъ участкѣ, добытый изъ шахты, расположенной по серединѣ рудоноснаго участка. По характеру, общему типу она не отличима отъ Городищенской, хотя нѣсколько бѣднѣе этой послѣдней.

### Земли села Городище.

Рудная залежь Городища описана Соколовымъ; такъ какъ съ тѣхъ поръ однако работы по добычѣ были расширены и производились нѣкоторыя развѣдки, то мнѣ слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ объ этомъ месторожденіи.

Итакъ разрабатываемая нынѣ часть, составляющая сѣверное окончаніе общей Шишкинско-Трубчаниновско-Городищенской залежи, будетъ вскорѣ выработана окончательно. Но эта часть не составляетъ единственного рудоноснаго места на земляхъ Городища. Руда обнаружена скважинами Бонковскаго на западной сторонѣ Б. Каменки. Кромѣ того въ нѣсколькихъ шурфахъ, заложенныхъ на западъ отъ теперешняго рудника горн. инж. Войневичемъ, была найдена руда. Въ виду этого описываемый участокъ возможно считать рудоноснымъ независимо отъ того составляетъ ли эта залежь продолженіе Красногригорьевскаго месторожденія или нѣтъ. Если выдѣлить участокъ, ограниченный съ западной части Красногригорьевской межой, съ южной размывомъ громаднаго лимана, въ которомъ соединяются рѣчки Томаковка съ Б. Каменкой, а границу эту приблизительно указать можно по рельефу местности, и наконецъ отъ сѣверо-востока предположить въ направленіи съ SO на NW граниты, начало которыхъ указывается шурфами Войневича, то получится крупныхъ размѣровъ площадь, которая, принимая во вниманіе даже самыя неожиданныя отклоненія гранитовъ, все же должна содержать приличный запасъ руды.

Однако, кроме глубины современного залегания, въ скимъ факторомъ, опредѣляющимъ характеръ руды, является, такъ сказать, географическое положеніе изслѣдуемаго мѣста залежи: чѣмъ она южнѣе, тѣмъ болѣе браунитообразными дѣлаются ея зерна, несмотря на всѣ возможныя колебанія глубины залеганія. И такъ въ шахтѣ № I при глубинѣ 42 мет. руда болѣе походитъ на городищенскую, чѣмъ въ шахтѣ № III при глубинѣ 36 мет. Конечно тутъ можно предполагать, что измѣненіе рельефа поверхности произошло относительно недавно, что раньше на № III лежалъ болѣе толстый слой породъ... однако такое объясненіе является довольно произвольнымъ.

Итакъ не отрицая полностью возможности воздействиія заключающіхъ кислородъ атмосферныхъ водъ на руду, осадившуюся въ видѣ  $Mn_3 O_4$  благодаря которому она могла перейти въ болѣе постоянное для марганца соединеніе  $Mn O_2$  основную причину полной и частной метаморфизации будемъ искать въ условіяхъ ея залеганія въ морѣ, въ которомъ она образовалась. И такъ на болѣе мелкихъ, побережныхъ горизонтахъ морскія воды, заключающія болѣе кислорода, могли при самомъ процессѣ отложенія марганцевой руды проявлять окислительное дѣйствіе сильнѣе, чѣмъ въ болѣе удаленной отъ берега, болѣе глубокой полосѣ. Кромѣ того фактъ нѣкотораго общаго выклиниванія руды въ южномъ направлениі, а также то обстоятельство, что руда подстилается въ южныхъ участкахъ болѣе толстымъ слоемъ глинъ и песковъ, чѣмъ въ сѣверныхъ, наводить на мысль, что руда осаждалась во время положительного движенія дна морского (подъема). Если такъ, то руда южныхъ районовъ является болѣе молодой чѣмъ сѣверныхъ, такъ какъ пластъ руды въ этомъ случаѣ образовался, постепенно отступая отъ берега, по мѣрѣ обмеленія моря вслѣдствіе подъема дна и заноса его пескомъ и иломъ. Это заключеніе является непосредственнымъ выводомъ изъ того, что образованія, обусловленныя жизнью микроорганизмовъ, пріурочены своимъ возникновеніемъ строго къ морскому горизонту жизни этихъ микроорганизмовъ\*). Къ разбору этого вопроса мы еще вернемся.

### Нѣкоторые общіе выводы.

Въ обще-геологическомъ отношеніи развѣдки не могли и не дали много нового. Вотъ то небольшое количество фактовъ и возвѣній, которыми я могу подѣлиться:

Итакъ 1) понтийской ярусъ распространенъ по всѣмъ возвышеніямъ мѣстамъ описываемой мѣстности. Въ петрографическомъ отя-

\* ) См. Соколовъ.

шении его можно назвать известняковымъ, такъ какъ эта порода является въ самыхъ разнообразныхъ разновидностяхъ главной массой яруса, зелено-сѣрые пропластки глинъ под чиневы ей. Пласти известняковъ не выдерживаютъ одинакового характера на большомъ протяженіи, выклиниваются, переходятъ въ другія разновидности, а также въ глины. 2) Сарматскій ярусъ состоить главнымъ образомъ изъ глинъ самыхъ разнообразныхъ свойствъ и окрашенныхъ во всевозможные цвѣта, сѣрий, зеленый, синій и даже черный. Известняки попадаются въ этомъ ярусе въ видѣ короткихъ и тонкихъ пропластковъ, а также въ видѣ отдельныхъ, иногда очень твердыхъ, кристаллическаго строенія валуновъ. Верхняя часть яруса состоить изъ короткихъ пластовъ глинъ, смѣняющихъ быстро другъ друга или незамѣтно переходящихъ одна въ другую или въ песокъ. Такъ, напр., глины синія переходятъ въ зеленые и черные. Нижняя часть, состоящая изъ чистаго или глинистаго песку, является слоемъ, имѣющимъ громадное протяженіе, такъ что его можно считать характернымъ звеномъ этого яруса. 3) Пласть зеленыхъ глинъ, покрывающихъ почти повсемѣстно марганцевую руду, отнесенный Соколовымъ на основаніи стратиграфическихъ данныхъ условно къ сарматскому ярусу, такъ какъ палеонтологические остатки не найдены въ немъ, по моему воззрѣнью надо считать переходнымъ звеномъ; нижняя часть его олигоценовскаго возраста, верхняя переходнаго, рѣзко выраженной границы между сарматскимъ и олигоценовымъ ярусомъ не существуетъ. Соколовымъ точно не указываются тѣ стратиграфическія отношенія, на основаніи которыхъ зеленые глины отнесены имъ къ сарматскому ярусу, кромѣ развѣ факта прониканія ихъ иногда въ неровности марганцеваго пласта, что Соколовъ объясняетъ размывомъ и послѣдующимъ отложеніемъ. Такъ какъ мнѣ не удалось наблюдать такого рода фактовъ, то думаю что они являются исключеніями и могутъ быть объяснимы факторами дѣйствовавшими въ самомъ олигоценовомъ морѣ, напр. береговыми теченіями. Мнѣ приходилось не однократно затрудняться въ опредѣленіи конца сине-зеленыхъ безусловно сарматскихъ глинъ и начала зеленыхъ надмарганцевыхъ. Съ другой стороны нижня части этихъ глинъ тѣсно связаны съ марганцевымъ пластомъ; въ нихъ попадаются комки известняка, похожіе на имѣющіеся въ марганцевой рудѣ и подстилающей ее зеленой глины. Къ тому же тонкій слой бурыхъ глинъ, сопровождающій марганцевый пластъ надо считать не самостоятельнымъ слоемъ, а просто частью зеленыхъ глинъ, окрашенныхъ марганцевистымъ веществомъ въ бурый цвѣтъ. Вездѣ, гдѣ отсутствуетъ марганецъ, отсутствуютъ и бурыя прослойки. Нижняя часть зеленыхъ глинъ изобилуетъ во многихъ мѣстахъ обломочными кварцевыми зернами, точно такими же, какія

находятся въ подмарганцевой „яблочно-зеленой“ глине. Какъ по цвету, такъ и по другимъ свойствамъ нижня и верхня зеленая глины не отличимы. Въ случаяхъ выклинивания марганцеваго пласта обыкновенно нѣтъ возможности узнать, имѣемъ ли мы дѣло съ надмарганцевыми или подмарганцевыми глинами до тѣхъ поръ, пока не опредѣлится положеніе ихъ по отношенію къ гранитамъ.

Полагаю, что нижня части зеленыхъ глинъ, марганцевый пластъ и находящіяся подънимъ яблочно-зеленая глина—одновременныя образования, такъ что глинистое вещество пласта не что иное, какъ тѣ же глины, окрашенныя большимъ количествомъ Mn O<sub>2</sub>. Марганцевый пластъ какъ будто раскололъ зеленая глины и находится въ самой тѣсной связи съ ними.

Что касается структуры самого марганцеваго мѣсторожденія, то могу высказать слѣдующее: есть основанія предположить тѣсную связь между продольною складчатостью южно-русского древне-кристаллическаго массива и строеніемъ Никопольско-Городищенскаго района марганцевыхъ рудъ также точно, какъ это сдѣлано по отношенію Криворожскихъ красножелѣзняковыхъ залежей.

Согласно теоріи Соколова, по которой марганцевые минералы образовались на нѣкоторомъ строго опредѣленномъ горизонте моря, залежи ихъ должны находиться въ тѣсной зависимости отъ строенія морского дна, то-есть дна моря въ олигоценовскомъ періодѣ. Такъ какъ дно морское, равно какъ и материкъ въ это время, не было покрыто никакими образованіями, то въ вертикальномъ сѣченіи перпендикулярномъ складкамъ, оси которыхъ направлены по меридіанамъ, а слѣдовательно въ сѣченіи по географической параллели, поверхность дна даетъ волнобразную линію. Любая же горизонтальная плоскость пересѣкаетъ эти складки по удлиненнымъ эллипсоидобнымъ линіямъ, которая сочетаясь даютъ намъ нѣкоторую извилистую линію, въ виду того что поверхность гранитнаго массива имѣть, по крайней мѣрѣ въ рассматриваемой нами части, общее паденіе съ N на S. Схема залежей получается отъ разрѣза подводной поверхности гранитовъ двумя горизонтальными плоскостями, соответствующими minimum и maximum глубины, на которой могли нарости марганцевые минералы (см. черт. № 4).

Согласно высказанному мнѣнію, надо полагать, что 1) толщина пласта по направленію съ сѣвера на югъ должна вообще уменьшаться. Это наблюдается на самомъ дѣлѣ: средняя толщина на Городищенскомъ рудникѣ 2,80 мет., на Трубчаниновскомъ 2,20 мет., въ сѣверной части Шишкиныхъ 1,70 метр., а въ южной у межи съ дер. Маріевкой уменьшается до 1,20 метр. 2) Въ нѣкоторомъ растояніи отъ границы съ гранитами мощность должна доходить своего Max., такъ

какъ вблизи грядъ вездѣ должны имѣться глубины соотвѣтствующія самому благопріятному горизонту для наростанія марганца. Возрѣніе это подтверждается цѣлымъ рядомъ скважинъ и шахтой Отченашевской, въ которой толщина марганцеваго пласта 3,00 (мет. см. планъ). 3) Обратимся къ „Картѣ Распространенія Марганцевыхъ Рудъ“ Соколова, оставивъ въ сторонѣ окрестности Кривого Рога, мало изслѣдованныя въ отношеніи марганцевыхъ залежей и мнѣ незнакомыя, мы видимъ поочередное чередованіе марганцевыхъ залежей и гранитныхъ грядъ: гряда гранитовъ на западѣ отъ рѣки Соленої, на востокѣ же отъ нея марганцевый пластъ. При рѣкѣ Чертомлыкѣ въ южной части его теченія появляются граниты, а болѣе на востокѣ опять марганецъ. Мѣсторожденіе это отдѣлено отъ Красногригоріевскаго грядой, которую омываетъ балка Малая Каменка съ выходами гранитовъ. Опять таки между Красногригоріевкой и Городищемъ имѣется небольшая гряда, мимо которой проходитъ р. Большая Каменка. Конецъ этой гряды извѣстенъ, онъ находится у рудничной жилой колоніи; немного южнѣе въ колодцѣ найденъ марганецъ, такъ что въ этомъ пункѣ существуетъ соединеніе залежей Красногригоріевской и Городищенской.

Общій пластъ Городищенскаго рудника, западной части Трубчаниновыхъ, имѣніе Шишкіныхъ и деревня Маріевка отдѣленъ отъ Николаевскаго, восточной части Трубчаниновыхъ, отъ развѣданнаго у Илиныхъ, Шпонки и въ дер. Грушевкѣ грядой гранитной, западный край которой прослѣженъ развѣдками вплоть до Рѣчища.

Конечно мною указаны не всѣ гряды; кроме помѣченныхъ по выходамъ гранитовъ, могутъ быть еще другія, намъ не извѣстныя.

По сообщенію гражд. инжен. Миклашевскаго у Шпонки имѣется только узенькая въ иѣсколько десятковъ саженей полоска марганцевой руды, что соотвѣтствуетъ средней части залежи по схемѣ. Дальше на востокѣ развѣдокъ не производилось, такъ что ничего положительного о строеніи залежей здѣсь сказать нельзя. Само собой, что при примѣненіи общей теоріи къ дѣйствительности надо сообразоваться и со второстепенными факторами. И таѣ величина складокъ-грядъ вообще не одинакова, затѣмъ онѣ подвергались еще до отложенія марганца вывѣтриванію и размыву, что все вмѣстѣ отражается на очертаніи границъ залежи.

Не менѣе вѣскимъ факторомъ является новѣйший и диллювиальный рѣчной размывъ. Такъ какъ рѣки и балки этого района протекаютъ между гранитными складками вдоль ихъ, то рельефъ мѣстности можетъ до иѣкоторой степени служить указаніемъ нахожденія марганцеваго пласта; я говорю до иѣкоторой степени потому, что возвышенности не всегда соотвѣтствуютъ грядамъ, а рѣчные долины подчасъ


пересекаютъ гряды перпендикулярно ихъ оси—самый крупный при мѣрѣ этого явленія это теченіе Днѣпра отъ села Бѣленкова до гор. Никополя.

Во всякомъ случаѣ нынѣ известные рудоносные участки открыты главнымъ образомъ благодаря близости Днѣпра, то-есть благодаря обусловленнымъ его притоками неровностямъ поверхности. Такъ что для будущихъ излѣдований и поисковъ остается еще большое поле впереди. Запасъ марганцевыхъ рудъ надо считать пока величиной неопределенной, во всякомъ случаѣ гораздо больше известной до нынѣ.

---


Stromatopora C.G. Diderichseni, "Южно-русское морское макроподание".

Чертежи 1.




Чертежи 4.


Гранит.



Чертежи 2.




Чертежи 3.



Заданы гранитные на побережье.

Но синтаксис „Марганического языка професии“ С. Н. Добровольского.



## УСЛОВНЫЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Граница пустого кармана в пласте

Граница маркированной залежи

Граница скважинных залежей

Выход скважинов на поверхность

